

中文核心期刊

中国科技核心期刊

ISSN 1004-5805

CN 32-1211/R

临床麻醉学杂志[®]

LINCHUANG MAZUIXUE ZAZHI

2014年11月 第30卷 第11期

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIOLOGY

Volume 30 Number 11

November 2014

ISSN 1004-5805



万方数据



中华医学会南京分会
CHINESE MEDICAL ASSOCIATION
NANJING BRANCH

临床麻醉学杂志

LINCHUANG MAZUIXUE ZAZHI

2014 年 11 月 第 30 卷 第 11 期

目 次

临床研究

- 一氧化氮吸入预测肺动脉高压的可逆性 王丽妮 姜桢 1045
- 右美托咪定对心肺转流患者中性粒细胞明胶酶脂质运载蛋白和胱抑素 C 的影响 斯妍娜 方兆晶 赵倩等 1048
- Shikani 可视喉镜与 Mc Coy 喉镜对气管插管应激反应影响的比较 孙怡 龙瑞春 赵国栋 1052
- 不同浓度布比卡因胸段硬膜外阻滞对单肺通气期间动脉氧合的影响 蒋大明 王丽君 鲁振等 1056
- 改良电休克治疗中丙泊酚与依托咪酯对照研究的系统评价 贾玉萍 苏亮 梁世桥等 1059
- 心肺转流后股-桡动脉压力阶差的影响因素 许佩龙 孙杰 丁正年 1065
- 三种小剂量非去极化肌松药在无痛纤维支气管镜检查中的应用及效果 段若望 宋炯 李玉萍 1069
- 广东省困难气道管理现状调查及分析 马武华 代文杰 王勇 1072
- 三种喉镜对老年患者气管插管应激反应的影响 芦曼 陈永权 1077
- 静脉预注右美托咪定对罗哌卡因蛛网膜下腔阻滞效应的影响 樊友凌 徐世元 彭惠华等 1081
- 米库氯铵与顺苯磺酸阿曲库铵在婴幼儿唇腭裂手术中的应用比较 仲山 尹宁 黄洪强等 1084
- 帕瑞昔布钠与氟比洛芬酯术前应用对患者凝血功能的影响 邱良诚 陈彦青 郭艳华等 1087
- 全身麻醉术后认知功能障碍与血小板 β -淀粉样蛋白变化的关系 施丽燕 徐静 万燕杰 1091
- 臂丛神经阻滞在动静脉内瘘成形术中的应用 叶晓敏 叶仙华 胡丹红 1095
- 脉冲射频治疗脊神经后支综合征的临床研究 郑婧 梅敦成 李圣洪等 1098
- 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞用于患儿上肢手术 陈云俊 夏艳 夏新等 1101
- 右美托咪定在颅脑肿瘤手术中的应用 孟馥芬 维拉 宣斐等 1104
- 蛛网膜下腔阻滞用于超高龄患者髋部手术的临床观察 顾丽莉 陆丽娟 张中军等 1107

实验研究

- 非计划性拔管对兔气管黏膜形态结构的影响 吴钊洁 游志坚 林穗等 1110
- 丙泊酚抑制 H_2O_2 诱导的内皮细胞通透性增加 解春艳 肖金仿 赵振龙 1114

异氟醚吸入对老年大鼠长时程增强和脑源性神经营养因子的影响	石林玉 黄东亮 黄斌	1118
藻本内酯抑制星形胶质细胞中 NF- κ B 依赖的细胞因子的表达	陈永红 赵林霞 范冰冰等	1121
罗哌卡因所致毒性惊厥对幼鼠的学习记忆能力和星形胶质 纤维酸性蛋白的影响	侯璐璐 李丽 司军强	1125
临床经验		
丙泊酚联合硬膜外麻醉在俯卧位经皮肾镜钬激光碎石术中的应用	张维娥 邵雪梅	1129
普通气管导管自然弧度塑型光棒引导对鼻气管插管的影响	王伟 瞿健 赵丽萍等	1131
右美托咪定和咪达唑仑对胸腔镜小切口手术拔管期血流动力学影响的 比较	李佳静 张艳华 郑曼等	1133
一种安全简单的超声引导下腰丛神经阻滞新方法:“三叶草”法	杨纯勇 崔剑 甯交琳等	1135
综述		
急性呼吸窘迫综合征治疗的研究进展	刘晶晶 姜丽华 王蕾等	1137
麻醉方式对鼻内镜出血及术野的影响	杨阳 陈彦青	1140
病例报道		
床旁超声诊断术中不明原因失血一例	向元军 李岩松 魏新川等	1086
Klippel-Feil 综合征患者喉罩置入困难一例	王一男 徐铭军	1128
围麻醉期严重过敏反应一例	吴霞 孙杰 丁正年	1143
主动脉夹层合并右髂股动脉急性栓塞麻醉处理一例	王洪乾 刘晓江 刁玉刚等	1144
读者·作者·编者		
本刊可直接使用缩略语的词汇		1051
《临床麻醉学杂志》关于学术不端行为的声明		1076
《临床麻醉学杂志》对来稿署名的要求		1136
消息		
《临床麻醉学杂志》2015 年重点号征文通知		1068
国际华人麻醉学院(ICAA)通告		1090
《临床麻醉学杂志》2015 年度征订通知		1124

本刊稿约见本卷第 1 期 103~104 页 第 7 期 727~728 页

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIOLOGY

Volume 30, Number 11

November 2014

Predicting the reversibility of pulmonary artery hypertension by inhaled nitric oxide	1045
<i>WANG Li-ni, JIANG Zhen</i>	
The effects of dexmedetomidine on NGAL and Cystatin C after cardiopulmonary bypass in patients undergoing cardiovascular surgery	1048
<i>SI Yan-na, FANG Zhao-jing, ZHAO Qian, et al</i>	
The comparative study of Shikani optical stylet and Mc Coy laryngoscope on stress responses to tracheal intubation	1052
<i>SUN Yi, LONG Rui-chun, ZHAO Guo-dong</i>	
Effects of thoracic epidural anesthesia with different concentrations of bupivacaine on arterial oxygenation during one-lung ventilation	1056
<i>JIANG Da-ming, WANG Li-jun, LU Zhen, et al</i>	
Propofol versus etomidate for modified electroconvulsive therapy: a systematic review of randomized clinical trials	1059
<i>JIA Yu-ping, SU Liang, LIANG Shi-qiao, et al</i>	
Risk factors of femoral-radial artery pressure gradients after cardiopulmonary bypass	1065
<i>XU Pei-long, SUN Jie, DING Zheng-nian</i>	
The application and effect of three kinds of non-depolarizing muscle relaxant in painless fiberoptic bronchoscopy	1069
<i>DUAN Ruo-wang, SONG Jiong, LI Yu-ping</i>	
Preliminary survey on management of difficult airway in Guangdong province	1072
<i>MA Wu-hua, DAI Wen-jie, WANG Yong</i>	
Effects of three laryngoscopes on stress reaction in elderly patients during tracheal intubation	1077
<i>LU Man, CHEN Yong-quan</i>	
The effects of intravenous dexmedetomidine premedication on ropivacaine-induced subarachnoid blockade	1081
<i>FAN You-ling, XU Shi-yuan, PENG Hui-hua, et al</i>	
A comparison of effect of mivacurium and cistracurium in infants undergoing cleft lip and cleft palate surgery	1084
<i>ZHONG Shan, YIN Ning, HUANG Hong-qiang, et al</i>	
Effects of preemptive parecoxib sodium versus flurbiprofen axetil on blood coagulation	1087
<i>QIU Liang-cheng, CHEN Yan-qing, GUO Yan-hua, et al</i>	
Relationship between postoperative cognitive dysfunction and the expression of Amyloid- β protein in the platelet under general anesthesia	1091
<i>SHI Li-yan, XU Jing, WAN Yan-jie</i>	

Application of brachial plexus block in patients undergoing arteriovenous fistula angioplasty	1095
<i>YE Xiao-min , YE Xian-hua , HU Dan-hong</i>	
Pulsed radiofrequency is effective on treating the syndrome of posterior ramus of nerve	1098
<i>ZHENG Jing , MEI Dun-cheng , LI Sheng-hong , et al</i>	
Clinical study of ultrasound-guided interscalene combined with axillary brachial plexus block in children undergoing surgery of upper limb	1101
<i>CHEN Yun-jun , XIA Yan , XIA Xin , et al</i>	
The application of dexmedetomidine in patients with intracranial tumors undergoing craniotomy under general anesthesia	1104
<i>MENG Fu-fen , WEI La , XUAN Fei , et al</i>	
Clinical experience of subarachnoid block anesthesia used in super elderly patients with hip surgery	1107
<i>GU Li-li , LU Li-juan , ZHANG Zhong-jun , et al</i>	
Effect of unplanned extubation on the tracheal mucosa morphology in rabbits	1110
<i>WU Tian-jie , YOU Zhi-jian , LIN Sui , et al</i>	
Propofol inhibits H ₂ O ₂ -induced endothelial hyperpermeability	1114
<i>XIE Chun-yan , XIAO Jin-fang , ZHAO Zhen-long</i>	
The influence of isoflurane on long-term potentiation and brain derived neurotrophic factor in old rats	1118
<i>SHI Lin-yu , HUANG Dong-liang , HUANG Bin</i>	
Ligustilide inhibits NF- κ B dependent cytokines upregulation in primary cultured astrocytes	1121
<i>CHEN Yong-hong , ZHAO Lin-xia , FAN Bing-bing , et al</i>	
Effect of ropivacaine-induced toxicity on learning and memory abilities and the expression of GFAP in the hippocampus of immature rats	1125
<i>HOU Lu-lu , LI Li , SI Jun-qiang</i>	

本期责任编辑 蒋淑娟

临床麻醉学杂志

LINCHUANG MAZUIXUE ZAZHI
JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIOLOGY

月刊 Monthly

1985年3月创刊
Established in March 1985

总编辑 徐建国
Editor in Chief XU Jian-guo

编辑部主任 万茹
Managing Director WAN Ru

中国标准连续出版物号
ISSN 1004-5805
CN 32-1211/R

主办 中华医学会南京分会
210003, 南京市紫竹林3号

编辑 临床麻醉学杂志编辑委员会
210003, 南京市紫竹林3号
电话: (025)83472912

出版 临床麻醉学杂志编辑部
210003, 南京市紫竹林3号
电话: (025)83472912
传真: (025)83472912
E-mail: jca@lcmzxzz.com
http://www.lcmzxzz.com

印刷 江苏省地质测绘院

发行 国内: 江苏省南京邮局
国外: 中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信箱, 100044)
代号: M4669

订购 全国各地邮局

邮编 临床麻醉学杂志编辑部
210003, 南京市紫竹林3号
电话: (025)83472912

Sponsor Chinese Medical Association, Nanjing
Branch 3 Zizhulin, Nanjing, 210003

Editing Editorial Board of Journal of
Clinical Anesthesiology
3 Zizhulin, Nanjing, 210003
Tel: 0086-25-83472912

Publishing Publishing House, Journal of
Clinical Anesthesiology
3 Zizhulin, Nanjing, 210003
Tel: 0086-25-83472912
Fax: 0086-25-83472912
E-mail: jca@lcmzxzz.com
http://www.lcmzxzz.com

Printing Jiangsu Geologic Surveying and
Mapping Institute

Overseas Distributor China International Book
Trading Corporation
(P. O. Box 399, Beijing, China, 100044)
Code No. 4669M

Mail Order Editorial Office, Journal of
Clinical Anesthesiology
3 Zizhulin, Nanjing, 210003
P. R. China
Tel: 0086-25-83472912


第30卷 第11期 2014年11月15日出版
Vol. 30 No. 11 Publication date: November 15, 2014

南京市工商广告许可证第 3201004890053 号
凡属印刷问题, 请与江苏省地质测绘院联系 (025)57713944

邮发代号: 28-35
定价: 12.00 元

原研所得 携手护航

• 专利EDTA抑菌配方 • 专利预充注射器



EDTA: 依地酸二钠

得普利麻®(丙泊酚)简明处方资料(Diprivan_V(6), 详见药品说明书)

[适应症]

1%浓度: 用于全身麻醉的诱导和维持、重症监护成年人病人接受机械通气时的镇静以及外科手术及诊断时的清醒镇静。

2%浓度: 用于全身麻醉的诱导和维持、重症监护成年人病人接受机械通气时的镇静。

[用法用量] 经静脉输注

成人 全麻诱导: 根据临床反应调整给药速率, 年龄小于55岁者1.5–2.5mg/kg。年龄更大者, 剂量需求可能减少。

全麻维持: 持续输注: 通常4–12mg/kg/h。

重症监护期间镇静: 剂量根据所需镇静深度调节, 通常输注速度为0.3–4mg/kg/h。

1%浓度

全麻诱导: 本品不推荐用于1个月以下的儿童。当用于小儿麻醉诱导时, 建议缓慢给予本品直至临床体征表明麻醉起效, 剂量应根据年龄和(或)体重调节。年龄超过8岁的多数病人, 麻醉诱导需要约2.5mg/kg的丙泊酚注射液。低于这个年龄, 尤其是1个月到3岁之间, 所需的药量可能更大(按体重计为2.5–4mg/kg)。ASA 3级和4级的小儿建议用较低的剂量。

全麻维持: 本品不推荐用于1个月以下的儿童。通过输注或重复单次注射给予本品, 能维持麻醉所需深度。所需的给药速率在病人之间有明显的不同, 通常每小时9–15mg/kg的给药速率能够获得令人满意的麻醉。

2%浓度

全麻诱导: 本品不推荐用于3岁以下的儿童。当用于小儿麻醉诱导时, 建议缓慢给予本品直至临床体征表明麻醉起效, 剂量应根据年龄和(或)体重调节。年龄超过8岁的多数病人, 麻醉诱导需要约2.5mg/kg的丙泊酚注射液。低于这个年龄, 所需的药量可能更大。ASA 3级和4级的小儿建议用较低的剂量。全麻维持: 本品不推荐用于3岁以下的儿童。通过输注或重复单次注射给予本品, 能维持麻醉所需深度。所需的给药速率在病人之间有明显的不同, 通常每小时9–15mg/kg的给药速率能够获得令人满意的麻醉。

详细情况请参考说明书。

[不良反应] 以得普利麻进行麻醉诱导通常是平稳的, 极少出现兴奋。最常报告的不良反应为麻醉药理学可预期的不良作用, 如低血压。考虑到麻醉的特性以及患者在接受重症监护, 故所报告的与麻醉及重症监护相关的不良事件可能会与所进行的操作或患者的身体状况相关。详细情况请参考说明书。

[禁忌] 禁用于丙泊酚注射液过敏者和因哮喘或会厌炎接受重症监护的各种年龄儿童的镇静。详细情况请参考说明书。

[注意事项] 得普利麻只能由接受过训练的麻醉医师或重症监护室医师给药, 应备有维持呼吸道通畅的人工通气和供氧设备; 有脂肪超载特殊危险的病人, 给予得普利麻时, 建议监测血脂水平; 单次输注本品必须不超过12小时, 在输注结束时或达12小时的时候, 无论哪种情况, 本品的贮器和输注线必须丢弃或替换; 在长期给予本品, 尤其是对于易患锌缺乏症, 有发热, 腹泻或主要败血症症状的患者需补充锌; 在ICU使用镇静剂应逐渐加量以维持最佳的供氧和血液动力学参数。本品不推荐用于1个月以下儿童的全身麻醉和16岁以下儿童的镇静。详细情况请参考说明书。

仅供医药专业人士参考, 详细处方资料备索。

详细处方资料备索忠告: 请按医生处方购买和使用
进口药品注册证号: H20130504 H20130465

苏药广审(文): 第2014040170号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

EDTA中国专利号: 95197780.6

PFS中国专利号: 01807817.6



AstraZeneca
阿斯利康
携手为生命护航