

ISSN

Q K 1 8 3 2 9 5 2

CN 11-4989 / R

5

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

CLINICAL MEDICATION JOURNAL

2018年5月
第16卷 第5期

- 抑郁症药物治疗专题报道
- 新型神经氨酸酶抑制剂——抗流感药物AV5080
- 治疗帕金森病新药沙芬酰胺
- 培哚普利治疗充血性心力衰竭的 meta 分析
- 含碘造影剂致IV度血小板减少案例报道及文献复习

ISSN 1672-3384



0 5>

万方数据

北京药学会

Beijing Pharmaceutical Association

主 管 北京市食品药品监督管理局

主 办 北京药学会

名誉主编 于德泉 王汝龙

主 编 李大魁 翟所迪

社 长 薛立宁

副 主 编 胡 欣 崔一民 赵荣生 梅 丹 钟 武

本期执行主编 赵荣生

编辑部主任 马文利

编辑出版 《临床药物治疗杂志》社

地 址 北京市朝阳区北三环中路2号(100120)

电 话 86(10)6417 8704-301/302

邮 箱 zazhi@vip.sina.com

网 址 http://www.lcywzlzz.com

广告经营许可证 京朝工商广字第8112号(1-1)

印 刷 北京万谦恒溢广告传媒有限责任公司

国内发行 北京报刊发行局

国内订阅 全国各地邮局

邮发代号 82-110

国外发行 中国国际图书贸易总公司

邮发代号 BM 1764

邮 购 《临床药物治疗杂志》社

国内定价 每期18.00元 全年216.00元

2018年第16卷第5期5月出版

ISSN 1672-3384

CN 11-4989/R

2018年版权归《临床药物治疗杂志》社所有
除非特别声明

本刊电子版出版发行合作伙伴

中国知网 www.cnki.net

万方数据 www.wanfangdata.com.cn



目次

■ 抑郁症药物治疗专题报道

- 抗抑郁的治疗理念与发展 李卉, 师乐, 陆林 (1)
《中国抑郁障碍防治指南》药物治疗解读 牛雅娟 (6)
常用抗抑郁药物的临床应用与展望 徐家玥, 秦舟, 徐珽 (9)
抑郁症治疗新药伏硫西汀的药理作用与临床评价 田姗姗, 郭海飞 (14)

■ 述评

- 新型神经氨酸酶抑制剂——抗流感药物AV5080 陈思奥, 钟武 (19)
治疗帕金森病新药沙芬酰胺 张舒, 陈晴, 胡咏川, 刘蕾 (22)

■ 综述

- 纤维肌痛综合征临床药物治疗研究进展 张哲浩 (26)

■ 论著

- 培哚普利治疗充血性心力衰竭的meta分析 文程, 易湛苗, 门鹏, 翟所迪 (31)
复方甘草片治疗感染后咳嗽的meta分析 王金鹏, 李显林, 王玲, 田卫星 (37)
环孢素A治疗糖皮质激素抵抗的重度溃疡性结肠炎的临床研究 张兵兵, 戴卫, 张晓兵, 王莉莉, 张鲲鹏 (43)
抗结核药物利福平不同时间点血药浓度对比分析 陈明, 吴首蓉, 赵冠人 (47)
唑来膦酸盐单次静脉输注治疗Paget骨病的疗效分析 李伟, 李全志, 王茹, 陈佳, 左庆瑶, 王志新, 王红, 邓微 (50)
中医真武汤加减疗法治疗心肾阳虚型慢性心衰患者的临床应用 张优 (55)
华蟾素胶囊联合化疗药物治疗非小细胞肺癌临床疗效meta分析 黄若尘, 苏永华 (59)
来那度胺联合利妥昔单抗治疗套细胞淋巴瘤的疗效及安全性分析 李晋文, 孙晓蕊, 张晓磊, 章萍 (64)

右美托咪定对全麻单肺通气患者炎症因子影响的 meta 分析

..... 王纯, 王先学, 潘道波 (70)

115 例用药错误分析及防范策略 秉芳, 王英美, 孙路路 (76)

■ 药物与临床

含碘造影剂致Ⅳ度血小板减少案例报道及文献复习 张红, 李小平, 于芝颖, 付玥, 冯婉玉 (80)

临床药师参与卒中后相关感染治疗的案例分析

..... 周楠, 丰航, 朱亚宁, 张丹, 李黎, 张鹏 (84)

1 例巴氯芬治疗急性脑梗死合并顽固性呃逆病例的药学监护

..... 梁宝方, 苏建伟, 褚燕琦 (87)

1 例预防性使用地塞米松后出现奥沙利铂急性过敏反应的文献复习

..... 司倩, 陈楠, 葛春丽 (90)

Responsible Institution

Beijing Food and Drug Administration

Sponsor

Beijing Pharmaceutical Association

Honorary Editor-in-Chief

YU De-quan WANG Ru-long

Editor-in-Chief

LI Da-kui ZHAI Suo-di

Proprieter

XUE Li-ning

Deputy Editor-in-Chief

HU Xin CUI Yi-min ZHAO Rong-sheng

MEI Dan ZHONG Wu

Executive Editor-in-Chief

ZHAO Rong-sheng

Editorial Director

MA Wen-li

Edited and Published by

Clinical Medication Journal Agency

Address: No.2, North Third Ring Road, Chaoyang

District, Beijing 100120, China

Tel: 86 (10) 6417 8704-301/302

E-mail: zazhi@vip.sina.com

Website: <http://www.lcywzlzz.com>

Printed by

Beijing Wanqian Hengyi Advertising Media Co.,Ltd.

Domestic Distributor

Beijing Post Office

Code No.82-110

Overseas Distributor

China International Book Trading Corporation

Code No.BM1764

Price: ¥ 18.00

2018 Vol.16 No.5

Publication Date May, 2018

ISSN 1672-3384

CN 11-4989/R

Copyright

2018 by the Clinical Medication Journal Agency

CONTENTS

The concept and development of antidepressant treatment

..... LI Hui, SHI Le, LU Lin (1)

Interpretation of drug therapy of Chinese Guidelines for Prevention and Treatment of Depression NIU Ya-juan (6)

Clinical application and prospect of commonly used antidepressants

..... XU Jia-yue, QIN Zhou, XU Ting (9)

Pharmacology and clinical evaluation of vortioxetine:a new drug for the treatment of depression TIAN Shan-shan, GUO Hai-fei (14)

A novel influenza virus neuraminidase inhibitor —— AV5080

..... CHEN Si-ao, ZHONG Wu (19)

Safinamide: a new drug for the treatment of Parkinson's disease

..... ZHANG Shu, CHEN Qing, HU Yong-chuan, LIU Lei (22)

Advances in clinical drug therapy of fibromyalgia syndrome ZHANG Zhe-hao (26)

A meta-analysis of the efficacy and safety of perindopril in the treatment of congestive heart failure WEN Cheng, YI Zhan-miao, MEN Peng, ZHAI Suo-di (31)

Meta-analysis on treatment of post-infectious cough by compound liquorice tablets

..... WANG Jin-peng, LI Xian-lin, WANG Ling, TIAN Wei-xing (37)

Clinical research on cyclosporin A in the treatment for severe glucocorticoid-resistant ulcerative colitis

..... ZHANG Bing-bing, DAI Wei, ZHANG Xiao-bing, WANG Li-li, ZHANG Kun-peng (43)

Comparative study on serum C_{2h} and C_{4h} of antituberculosis drug rifampicin

..... CHEN Ming, WU Shou-rong, ZHAO Guan-ren (47)

Efficacy analysis of zoledronate single vein infusion on Paget's disease of bone LI Wei,

LI Quan-zhi, WANG Ru, CHEN Jia, ZUO Qing-yao, WANG Zhi-xin, WANG Hong, DENG Wei (50)

Clinical application of Traditional Chinese Medicine zhenwu decoction in chronic heart failure patients with heart kidney Yang deficiency ZHANG You (55)

Clinical efficacy of cinobufacin capsules combined with chemotherapeutic drugs in the treatment of non-small cell lung cancer: a meta-analysis

..... HUANG Ruo-chen, SU Yong-hua (59)

Efficacy and adverse effect of lenalidomide plus rituximab in mantle cell lymphoma patients: a meta-analysis LI Jin-wen, SUN Xiao-rui, ZHANG Xiao-lei, ZHANG Ping (64)

- Effects of dexmedetomidine on myocardial ischemia-reperfusion injury: a meta-analysis of randomized controlled trials** WANG Chun, WANG Xian-xue, PAN Dao-bo (70)
- Analysis on 115 cases of medication errors and prevention strategies** LI Fang, WANG Ying-ying, SUN Lu-lu (76)
- Case report and literature review of contrast agent caused IV-thrombocytopenia** ZHANG Hong, LI Xiao-ping, YU Zhi-ying, FU Yue, FENG Wan-yu (80)
- Clinical pharmacists' participation in the treatment of stroke-associated infection** ZHOU Nan, FENG Hang, ZHU Ya-ning, ZHANG Dan, LI li, ZHANG Peng (84)
- Pharmaceutical care of baclofen therapy for a patient with acute cerebral infarction combined with intractable hiccups** LIANG Bao-fang, SU Jian-wei, CHU Yan-qi (87)
- One case of acute anaphylaxis induced by oxaliplatin with prophylactic use of dexamethasone: case report and literature review** SI Qian, CHEN Nan, GE Chun-li (90)

利伐沙班片

抗凝从此简便

- ◆ 口服抗凝 2–4小时达峰
- ◆ 适用于预防多种血栓疾病
 - 非瓣膜性房颤患者卒中和全身性栓塞预防
 - DVT/PE*治疗和预防复发
 - 关节置换术后VTE*预防

*治疗成人深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE）预防静脉血栓栓塞（VTE）

【药品名称】通用名称：利伐沙班片 商品名称：拜瑞妥®(Xarelto®) 英文名称：Rivaroxaban Tablets

【成份】本品主要成份为利伐沙班。

【适应症及用法用量】1.用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者，以预防深静脉血栓形成（VTE）：口服10mg，每日1次。如伤口已止血，首次用药时间应在手术后6–10小时之间。避免在CrCl < 30mL/min的患者中使用利伐沙班。2.用于治疗成人深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），降低初始治疗6个月后DVT和PE复发的风险：急性DVT或PE的初始治疗推荐剂量是前三周15mg每日两次，之后维持治疗及降低DVT和PE复发风险的剂量是20mg每日一次。对于中度或重度肾功能损害患者：前三周，患者应接受15mg每日两次。此后，推荐剂量为20mg，每日一次。如果评估得出患者的出血风险超过DVT及PE复发的风险，必须考虑将剂量从20mg每日一次，降为15mg每日一次。在CrCl < 30mL/min的患者中应避免使用利伐沙班。3.用于具有一种或多种危险因素（例如：充血性心力衰竭，高血压、年龄≥75岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史）的非瓣膜性房颤成年患者，以降低卒中和全身性栓塞的风险：20mg每日一次，对于低体重和高龄（>75岁）的患者，可酌情使用15mg每日一次。对于中度或重度肾功能损害患者，推荐剂量为15mg每日一次。肌酐清除率<15mL/min的患者避免使用利伐沙班。口服，利伐沙班10mg可与食物同服，也可以单独服用，15mg或20mg片剂应与食物同服。

【不良反应】不良反应主要见于出血，疲劳，牙痛，口咽痛，上腹部疼痛，消化不良，鼻窦炎，尿道感染，瘙痒、水疱，背痛，骨关节炎，四肢疼痛，肌肉痉挛，晕厥，粒细胞缺乏症，血小板减少，过敏反应等，详见说明书。

【禁忌】1.对利伐沙班或片剂中任何辅料过敏的患者。2.有临床明显活动性出血的患者。3.具有大出血显著风险的病灶或病情，例如目前或近期患有胃肠道溃疡，存在出血风险较高的恶性肿瘤，近期发生脑部或脊椎损伤，近期接受脑部、脊椎或眼科手术，近期发生颅内出血，已知或疑似的食管静脉曲张，动静脉畸形，血管动脉瘤或重大脊椎内或脑内血管畸形。4.除了转换抗凝治疗，或给予维持中心静脉或动脉导管通透所需剂量普通肝素（UFH）的特殊情况之外，禁用任何其他抗凝剂的伴随治疗，例如UFH、低分子肝素、肝素

衍生物、口服抗凝剂等。5.伴有凝血异常和临床相关出血风险的肝病患者，包括达到Child Pugh B 和 C 级的肝硬化患者。6.孕妇及哺乳期妇女。

【注意事项】1.在无充分的替代抗凝治疗的情况下，提前停用利伐沙班，将使血栓栓塞事件的风险升高。如因病理性出血或已完成治疗之外的原因而必须停用，则考虑给予另一种抗凝剂。2.利伐沙班将使出血风险升高，且可能引起严重或致死性出血。在决定是否给药时，必须权衡血栓栓塞事件的风险与出血的风险。谨慎观察服用利伐沙班的患者，以发现出血体征。建议在出血风险较高的情况下谨慎使用。如果发生严重出血，必须停用。合并使用影响止血的其他药物将使出血风险升高。合并使用联合P-gp及强效CYP3A4抑制剂将使利伐沙班暴露量增加并可能使出血风险升高。3.在采用硬膜外麻醉或脊椎穿刺时，接受抗血栓药预防血栓形成并发症的患者有发生硬膜外或脊柱血肿的风险，这可能导致长期或永久性瘫痪。4.不推荐以下出血风险较高的患者使用：先天性或获得性出血性疾病；未控制的严重高血压；不伴活动期溃疡但可导致出血并发症的胃肠道疾病；血管源性视网膜病；支气管扩张症或肺出血。5.如果需要接受有创性操作或手术治疗，在情况允许并基于医生的临床判断下，应在利伐沙班停药至少24小时之后再实施干预。6.利伐沙班片内含有乳糖。有罕见的遗传性乳糖或半乳糖不耐受、Lapp乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良的患者不能服用该药物。

详见说明书。

【进口药品注册证号】H20150213, H20150214, H20140132

【药物分类】处方药

【持证商】Bayer Pharma AG 拜耳医药保健有限公司

【生产企业】企业名称：Bayer Pharma AG 生产地址：51368 Leverkusen, Germany

京药广审（文）第2017110524号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

关于本产品完整的处方信息请参阅产品说明书

