



Q K 1 8 5 6 1 0 5

ISSN 1672-3384

CN 11-4989 / R

9

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

CLINICAL MEDICATION JOURNAL

临床药物治疗杂志

2018年9月
第16卷第9期

- 治疗非酒精性脂肪性肝炎的在研新药——elafibranor
- 新型抗巨细胞病毒药乐特莫韦的药理作用及临床研究
- 神经外科围手术期预防性抗癫痫药物的合理使用
- 两种止吐药物预防CINV的循证药物经济学评价

ISSN 1672-3384



9 771672 338180

万方数据

北京药学会

Beijing Pharmaceutical Association

月刊 2003年5月创刊
2018年9月 第16卷 第9期

ISSN 1672-3384
CN 11-4989/R

9

中国科技论文统计源期刊
中国科技核心期刊

临床药物治疗杂志
LINCHUANG YAOWUZHILIAO ZAZHI

主管 北京市食品药品监督管理局

主办 北京药学会

名誉主编 于德泉 王汝龙

主编 李大魁 翟所迪

社长 薛立宁

副主编 胡欣 崔一民 赵荣生 梅丹 钟武

本期执行主编 胡欣

编辑部主任 马文利

编辑出版 《临床药物治疗杂志》社

地址 北京市朝阳区北三环中路2号(100120)

电话 86(10)6417 8704-301/302

邮箱 zazhi@vip.sina.com

网址 http://www.lcywzlzz.com

广告经营许可证 京朝工商广字第8112号(1-1)

印刷 北京万谦恒溢广告传媒有限责任公司

国内发行 北京报刊发行局

国内订阅 全国各地邮局

邮发代号 82-110

国外发行 中国国际图书贸易总公司

邮发代号 BM 1764

邮购 《临床药物治疗杂志》社

国内定价 每期18.00元 全年216.00元

2018年第16卷第9期9月出版

ISSN 1672-3384

CN 11-4989/R

2018年版权归《临床药物治疗杂志》社所有

除非特别声明

本刊电子版出版发行合作伙伴

中国知网 www.cnki.net

万方数据 www.wanfangdata.com.cn



目次

■ 述评

治疗非酒精性脂肪性肝炎的在研新药——elafibranor

..... 谢菲, 宋兵, 周辛波 (1)

新型抗巨细胞病毒药乐特莫韦的药理作用及临床研究

..... 张舒, 陈晴, 封宇飞, 刘蕾 (5)

■ 综述

神经外科围手术期预防性抗癫痫药物的合理使用

王乔宇, 赵志刚 (9)

■ 论著

两种止吐药物预防 CINV 的循证药物经济学评价

..... 石亚飞, 陈伟, 王会凌, 李春雨, 戚姝姝, 李国辉 (14)

盐酸米诺环素联合多联抗生素糊剂对牙周炎合并牙髓病变相关炎症因子

的影响

黄晓君, 赵书山 (19)

隔姜灸神阙穴联合参苓白术散对艾滋病脾虚证腹泻及免疫功能的影响

..... 张绿浪, 邓长刚, 陈思源 (24)

头孢哌酮钠/舒巴坦钠联合异丙托溴铵溶液对哮喘合并肺部感染患者肺功

能及病原菌清除率的影响

徐真, 李曼 (29)

利用《药品不良反应信息通报》分析我国药品不良反应监测现状

..... 祝晓雨, 张伟光, 赵志刚 (34)

大黄素对病毒性心肌炎患者的疗效及血清指标的影响 ...

吴常裕, 杨海燕 (39)

15336例药物性肝损伤的临床特点分析

潘晨, 沈素 (43)

康柏西普治疗糖尿病视网膜病变有效性及安全性的 meta 分析

..... 司霞, 田攀攀, 于芝颖, 冯婉玉 (48)

右美托咪定对冠心病患者骨科手术期间不良心血管事件的影响

..... 姚曙东, 贾伟 (54)

枸橼酸氯米芬胶囊联合人绒毛膜促性腺激素治疗女性内分泌不孕症的效果

..... 张琪, 张燕, 马忠芳 (59)

局部应用氨甲环酸对老年不稳定转子间骨折行股骨近端防旋髓内钉围手术期失血量及安全性

研究 张忠岩, 李玉波, 王瑜, 石立涛, 杨小华 (64)

门急诊处方前置审核系统模式的建立对处方质量的影响 王娟, 崔晓辉, 姜德春, 杨军 (68)

药师-护士合作模式对冠心病患者二级预防用药教育的效果评价

..... 胡扬, 姜秋丰, 黄景慧, 顾晴, 刘莉, 冯频频, 梅丹 (72)

临床药师主导慢病管理对老年高血压患者用药依从性的影响

..... 武丹威, 施楠楠, 韩爽, 张天静, 张威, 甄健存 (75)

■ 药物与临床

1例抗癫痫药引起 Stevens-Johnson 综合征/中毒性表皮坏死症的病例分析

..... 李静, 李燕, 黄铃, 袁明勇 (78)

临床药师会诊的典型感染病例分析及会诊模式探讨 丁全, 陈世财 (82)

GDP/ML 化疗方案相关成人严重神经系统不良反应 3 例

..... 邹羽真, 梅丹, 王书杰, 韩菲, 段明辉 (86)

临床药师参与 1 例急性伊维菌素中毒救治的体会 赵娜, 史永志, 刘国华, 肖斌 (90)

Monthly Established in May,2003
Sep, 2018 Volume 16, Number 9

ISSN 1672-3384
CN 11-4989 / R

9

中国科技论文统计源期刊
中国科技核心期刊

临床药物治疗杂志
LINCHUANG YAOWUZHILIAO ZAZHI

Responsible Institution

Beijing Food and Drug Administration

Sponsor

Beijing Pharmaceutical Association

Honorary Editor-in-Chief

YU De-quan WANG Ru-long

Editor-in-Chief

LI Da-kui ZHAI Suo-di

Proprieter

XUE Li-ning

Deputy Editor-in-Chief

HU Xin CUI Yi-min ZHAO Rong-sheng

MEI Dan ZHONG Wu

Executive Editor-in-Chief

HU Xin

Editorial Director

MA Wen-li

Edited and Published by

Clinical Medication Journal Agency

Address: No.2, North Third Ring Road, Chaoyang

District, Beijing 100120, China

Tel: 86 (10) 6417 8704-301/302

E-mail: zazhi@vip.sina.com

Website: http://www.lcywzlzz.com

Printed by

Beijing Wanqian Hengyi Advertising Media Co.,Ltd.

Domestic Distributor

Beijing Post Office

Code No.82-110

Overseas Distributor

China International Book Trading Corporation

Code No.BM1764

Price: ¥ 18.00

2018 Vol.16 No.9

Publication Date Sep, 2018

ISSN 1672-3384

CN 11-4989/R

Copyright

2018 by the Clinical Medication Journal Agency

CONTENTS

A new drug for the treatment of NASH——elafibranor

..... XIE Fei, SONG Bing, ZHOU Xin-bo (1)

Pharmacological effects and clinical trials of a novel anti-CMV drug letermovir

..... ZHANG Shu, CHEN Qing, FENG Yu-fei, LIU Lei (5)

Rational prophylactical use of antiepileptic drugs during the perioperative peri-

od of neurosurgery: a review WANG Qiao-yu, ZHAO Zhi-gang (9)

The evidence-based pharmacoeconomics evaluation of two kind of antiemetics in

the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting

..... SHI Ya-fei, CHEN Wei, WANG Hui-ling, LI Chun-yu, QI Shu-ya, LI Guo-hui (14)

The effect of minocycline hydrochloride combined with multiple antibiotic paste

on inflammatory correlation factor in patients with periodontitis and pulp disea-

ses HUANG Xiao-jun, ZHAO Shu-shan (19)

The effect of moxibustion insulated by ginger at Shenque acupoint combined

with shenlingbaizhu powder on the treatment of AIDS diarrhea due to insuffi-

ciency of the spleen and Its influence on immune function

..... ZHANG Lv-lang, DENG Chang-gang, CHEN Si-yuan (24)

Influences of cefoperazone sodium and sulbactam sodium for injection combined

with ipratropium bromide solution on the lung function and pathogenic bacteria

scavenging rate in patients with asthma complicated with pulmonary infection

..... XU Zhen, LI Man (29)

A retrospective analysis based on Adverse Drug Reaction Information Bulletin

to explore the current situation of adverse drug reaction monitoring in China

..... ZHU Xiao-yu, ZHANG Wei-guang, ZHAO Zhi-gang (34)

Efficacy of emodin in children with viral myocarditis and its effect on serum in-

dexes WU Chang-yu, YANG Hai-yan (39)

Clinical features of drug-induced liver injury: a systematic analysis of the Chi-

nese literature including 15336 patients PAN Chen, SHEN Su (43)

- Efficacy and safety of conbercept for diabetic retinopathy :a meta-analysis
..... SI Xia ,TIAN Pan-pan ,YU Zhi-ying ,FENG Wan-yu (48)
- The effect of dexmedetomidine on the adverse cardiovascular events during orthopedic surgery in patients with coronary heart disease YAO Shu-dong ,JIA Wei (54)
- Effect of clomiphene citrate capsule combined with human chorionic gonadotropin on female endocrine infertility ZHANG Qi ,ZHANG Yan ,MA Zhong-fang (59)
- Effectiveness and safety of topical use of tranexamic acid for reducing perioperative bleeding in elderly patients with unstable femoral intertrochanteric fracture undergoing PFNA operation
..... ZHANG Zhong-yan ,LI Yu-bo ,WANG Yu ,SHI Li-tao ,YANG Xiao-hua (64)
- The establishment of prescription pre-examination system and its effect on the quality of the prescription in the outpatients and emergency patients WANG Juan ,CUI Xiao-hui ,JIANG De-chun ,YANG Jun (68)
- The effect of pharmacist-nurse cooperation mode on the secondary preventive medicine education for patients with coronary heart disease
..... HU Yang ,JIANG Qiu-feng ,HUANG Jing-hui ,GU Qing ,LIU Li ,FENG Pin-pin ,MEI Dan (72)
- The effect of chronic disease management led by clinical pharmacists on improving drug compliance in elderly patients with hypertension
..... WU Dan-wei ,SHI Nan-nan ,HAN Shuang ,ZHANG Tian-jing ,ZHANG Wei ,ZHEN Jian-cun (75)
- A case report of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrosis caused by antiepileptic drugs
..... LI Jing ,LI Yan ,HUANG Ling ,YUAN Ming-yong (78)
- Analysis of typical cases of infection clinical pharmacist participating in consultation and discussion on consultation mode DING Quan ,CHEN Shi-cai (82)
- Three cases of adult severe nervous system adverse reactions associated with GDP/ML chemotherapy regimen ZOU Yu-zhen ,MEI Dan ,WANG Shu-jie ,HAN Fei ,DUAN Ming-hui (86)
- Experience of clinical pharmacist participating in the treatment of a case of acute ivermectin poisoning
..... ZHAO Na ,SHI Yong-zhi ,LIU Guo-hua ,XIAO Bin (90)

利伐沙班片 抗凝从此简便

◆ 口服抗凝 2-4小时达峰 ◆ 适用于预防多种血栓疾病

- 非瓣膜性房颤患者卒中和全身性栓塞预防
- DVT/PE*治疗和预防复发
- 关节置换术后VTE*预防

*治疗成人深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE）预防静脉血栓栓塞（VTE）

【药品名称】通用名称：利伐沙班片 商品名称：拜瑞妥®(Xarelto®) 英文名称：Rivaroxaban Tablets

【成份】本品主要成份为利伐沙班。

【适应症及用法用量】1.用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者，以预防静脉血栓形成（VTE）：口服10mg，每日1次。如伤口已止血，首次用药时间应在手术后6-10小时之间。避免在CrCl < 30mL/min的患者中使用利伐沙班。2.用于治疗成人深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），降低初始治疗6个月后DVT和PE复发的风险：急性DVT或PE的初始治疗推荐剂量是前三周15mg每日两次，之后维持治疗及降低DVT和PE复发风险的剂量是20mg每日一次。对于中度或重度肾功能损害患者：前三周，患者应接受15mg每日两次。此后，推荐剂量为20mg，每日一次。如果评估得出患者的出血风险超过DVT及PE复发的风险，必须考虑将剂量从20mg每日一次，降为15mg每日一次。在CrCl < 30mL/min的患者中应避免使用利伐沙班。3.用于具有一种或多种危险因素（例如：充血性心力衰竭、高血压、年龄≥75岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史）的非瓣膜性房颤成年患者，以降低卒中和全身性栓塞的风险：20mg每日一次，对于低体重和高龄（>75岁）的患者，可酌情使用15mg每日一次。对于中度或重度肾功能损害患者，推荐剂量为15mg每日一次。肌酐清除率<15mL/min的患者避免使用利伐沙班。口服，利伐沙班10mg可与食物同服，也可以单独服用，15mg或20mg片剂应与食物同服。

【不良反应】不良反应主要见于出血，疲劳，头痛，咽喉痛，上腹部疼痛，消化不良，鼻窦炎，尿道感染，瘙痒、水疱，背痛，骨关节炎，四肢疼痛，肌肉疼痛，晕厥，粒细胞缺乏症，血小板减少，过敏反应等，详见说明书。

【禁忌】1.对利伐沙班或片剂中任何辅料过敏的患者。2.有临床明显活动性出血的患者。3.具有大出血显著风险的病灶或病情，例如目前或近期患有胃肠道溃疡，存在出血风险较高的恶性肿瘤，近期发生脑部或脊椎损伤，近期接受脑部、脊椎或眼科手术，近期发生颅内出血，已知或疑似的食管静脉曲张，动脉粥样硬化，血管动脉瘤或重大脊椎内或脑内血管畸形。4.除了转换抗凝治疗，或给予维持中心静脉或动脉导管通畅所需剂量普通肝素（UFH）的特殊情况之外，禁用任何其他抗凝剂的伴随治疗，例如UFH、低分子肝素、肝素

衍生物、口服抗凝剂等。5.伴有凝血异常和临床相关出血风险的肝病者，包括达到Child Pugh B 和 C 级的肝硬化患者。6.孕妇及哺乳期妇女。

【注意事项】1.在无充分的替代抗凝治疗的情况下，提前停用利伐沙班，将使血栓栓塞事件的风险升高。如因病理出血或已完成治疗之外的原因而必须停用，则考虑给予另一种抗凝剂。2.利伐沙班将出血风险升高，且可能引起严重或致死性出血。在决定是否给药时，必须权衡血栓栓塞事件的风险与出血的风险。谨慎观察服用利伐沙班的患者，以发现出血体征。建议在出血风险较高的情况下谨慎使用。如果发生严重出血，必须停用。合并使用影响止血的其他药物将出血风险升高。合并使用联合P-gp及强效CYP3A4抑制剂将使利伐沙班暴露量增加并可能使出血风险升高。3.在采用硬膜外麻醉或脊椎穿刺时，接受抗血栓药预防血栓形成并发的患者有发生硬膜外或脊柱血肿的风险，这可能导致长期或永久性瘫痪。4.不推荐以下出血风险较高的患者使用：先天性或获得性出血性疾病；未控制的严重高血压；不伴活动期溃疡但可导致出血并发的胃肠道疾病；血管源性视网膜病；支气管扩张症或肺出血。5.如果需要接受有创性操作或手术治疗，在情况允许并基于医生的临床判断下，应在利伐沙班停药至少24小时之后再实施干预。6.利伐沙班片内含有乳糖。有罕见的遗传性乳糖或半乳糖不耐受、Lapp乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良的患者不能服用该药物。详见说明书。

【进口药品注册证号】H20150213, H20150214, H20140132

【药物分类】处方药

【持证商】Bayer Pharma AG 拜耳医药保健有限公司

【生产企业】企业名称：Bayer Pharma AG 生产地址：51368 Leverkusen, Germany

京药广审（文）第2017110524号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

关于本产品完整的处方信息请参阅产品说明书

利伐沙班片
拜瑞妥® 10mg

5片装 1片装附赠药片15粒

利伐沙班片
拜瑞妥® 15mg

1片装附赠药片15粒

利伐沙班片
拜瑞妥® 20mg

1片装附赠药片20粒