




QK1940228

ISSN 1007-3795

CN63-1018/R

- ◆中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
- ◆中国期刊网收录期刊
- ◆中国学术期刊(光盘版)全文收录
- ◆中国核心期刊(遴选)数据库收录
- ◆青海省优秀科技期刊



2019年 第49卷 第5期 总第438期

# 青海医药杂志

QINGHAI YIYAO ZAZHI  
QINGHAI MEDICAL JOURNAL

2019.5

ISSN 1007-3795



771007379192

0.5>

青海省医药卫生学会联合办公室

万方数据

# 青海医药杂志

QINGHAI MEDICAL JOURNAL

月刊 1958年4月创刊 第49卷 第5期 2019年5月20日出版

## 主管

青海省卫生健康委员会

## 主办

青海省医药卫生学会联合办公室  
西宁市南川西路69号,810012

## 编辑

《青海医药杂志》编辑部  
(西宁市南川西路69号,810012)  
电话:0971-6266201  
E-mail:qhyyzz@163.com

## 总编辑

吴捷

## 副总编辑

王虎 吴世政 李占全 马宏  
马晓明 刘永年 边惠萍 李军茹  
李砚明 张雪飞 王昆 宋志强  
库启录 柴多 王守磊 杨钧  
贾嫫 陆涛 沈晓玲

## 印刷

青海新宏铭印业有限公司  
电话:0971-8133003

## 国内发行

西宁市邮政局  
邮发代号 56-6

## 广告许可证号

6300004000194

## 定价

全年96.00元,每期8.00元

## 中国标准连续出版物号

ISSN 1007-3795

CN 63-1018/R

## 目次

### 论著

探讨血清SAA、PCT、hs-CRP水平在COPD急性

加重期的临床应用价值

.....王金凤 刘春燕 李法斌 严进秋 包文芳(1)

### 临床经验

腹腔镜胃穿孔修补术患者在围术期血清白介素、应激激素

及氧化应激的变化分析.....多杰仁青(4)

法舒地尔联合曲美他嗪治疗不稳定性心绞痛的

疗效及安全性分析.....李元英(7)

青海高原地区NICU新生儿医院感染危险因素分析

.....康宏(10)

直接前入路与后外侧入路髋关节置换术

早期临床疗效研究.....胡江滔 李逸民 尹占海(13)

常规疗法基础上加用曲美他嗪对冠心病合并左心功能

不全的临床疗效观察.....陈晓培(17)

乳酸及静脉氧饱和度在重症感染中的指导价值.....祁维琛(19)

多烯磷脂酰胆碱胶囊联合复方甘草酸苷注射液治疗非酒精性

脂肪肝患者临床效果观察.....张海梅(22)

3D腹腔镜技术在治疗小儿鞘状突未闭疾病中的应用 .....	陕得智 魏晓明(24)
脐内侧襞在腹腔镜治疗小儿巨大型腹股沟斜疝中的应用 .....	魏晓明 陕得智 钟一才 王 昆(26)
<b>临床护理</b>	
西宁地区 15 例主动脉球囊反搏术的应用及护理体会 .....	陈 霞(28)
静脉专科治疗小组在促进静脉输液质量持续改进中的效果分析 .....	董 颖 潘丽杰 华 艳(31)
咪达唑仑及长托宁对心脏手术的麻醉效果及护理质量评分影响 .....	李增梅(34)
中医特色护理技术对中风后偏瘫患者临床康复的影响 .....	马家芬(37)
西宁地区 48 例三维标测指导房颤射频消融术的围手术期护理体会 .....	李玉蓉(40)
个体化护理干预在介入治疗大咯血患者中的应用 .....	牟玉珍 孙世蒙 雷振武(42)
俯卧位通气改善 ARDS 患者氧合的护理探讨 .....	孙 玉(44)
CICARE 模式对高血压患者的干预效果分析 .....	黄玉红(46)
高海拔、多民族地区泌尿系结石成分分析与综合护理干预 .....	潘怀清 李亚飞(49)
一例下肢静脉溃疡患者的护理体会 .....	袁 媛(52)
生育政策调整下经产妇母乳喂养自我效能分析 .....	杨海涛 刘焕年 季生莲(54)
手术室护理在预防胃肠道手术切口感染中的作用 .....	李满存(56)
微信教育的延伸护理模式在支气管哮喘患者中的应用效果 .....	李爱菊(58)
TISS-28 评分与护理分层管理在妇科护理管理中的协同效应 .....	牟淑珍 陈倩倩(60)
<b>临床检验</b>	
全血 $\gamma$ -干扰素释放试验和脑脊液 ADA 含量联合诊断结核性脑膜炎的临床价值 .....	魏连存 郭建英 韩启福(64)
乙型肝炎患者血清表面抗原浓度与肝功能多指标酶联合检测的相关性分析 .....	扎 洛(66)
<b>技术交流</b>	
超声定位在肥胖患者颈内静脉穿刺置管中的临床应用 .....	程启芳 赵锦秀(69)
<b>中医、中药、针灸</b>	
热敏灸配合中药外敷治疗小儿遗尿 43 例临床分析 .....	石明艳 王黎明 尚国菊 白永玲(71)
<b>基层医疗实践</b>	
浅谈基层医院 Masquelet 技术治疗慢性骨髓炎 5 例临床分析 .....	李先明(73)
<b>病例报告</b>	
颅内血管外皮细胞瘤一例报告并文献复习 .....	于泽亚(75)
药物超敏综合征一例报告 .....	杨 玲 谢艳迪 宋广军(78)
致作者 .....	(63)
征订启事 .....	(27、68)
书讯 .....	(72)

---

---

# QINGHAI MEDICAL JOURNAL

Monthly      Established in April, 1958      Volume 49, Number 5, May 20, 2019

---

**Responsible Institution**

Health Commission of Qinghai Province

**Sponsor**

Unite Office of Qinghai Medical  
& Health Association  
(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)

**Edited and Published by**

Editorial Department of Qinghai  
Medical Journal  
(810012, 69, West Nanchuan Road, Xining, Qinghai)  
Tel 0971-6266201  
E-mail qheyzz@163.com

**Editor in chief**

Wu Jie

**Deputy Editor in chief**

Wang Hu, Wu Shizheng, Li Zhanquan, Ma Hong  
Ma Xiaoming, Liu Yongnian, Bian Huiping  
Li Junru, Li Yanming, Zhang Xuefei, Wang Kun  
Song Zhiqiang, She Qilu, Chai Duo, Wang Shoulei  
Yang Jun, Jia Ying, Lu Tao, Shen Xiaoling

**Printer**

Qinghai Xinhongming Printing Co., Ltd

**Distributed by**

Xining Post Office (Qinghai China)  
Post code 56-6

**Price**

96 Yuan for the whole year, 8 yuan for  
each period

**Advertising license number**

6300004000194

**CSSN**

ISSN 1007-3795

CN 63-1018/R

## CONTENTS IN BRIEF

The Value of the Clinical Application of SAA, PCT and hs-CRP  
at Acute Exacerbation of COPD

..... Wang Jinfeng, Liu Chunyan, Li Fabin,

Yan Jinqiu, Bao Wenfang ( 1 )



## 讨 论

引起 DHS 的致病药物主要是抗惊厥药(卡马西平、苯妥英钠、拉莫三嗪)、磺胺类药物、别嘌醇、米诺环素、氨苯砜、金制剂等<sup>[1]</sup>。虽然这些药物没有共同的抗原表位,但具有相同的特征是能够抑制 B 细胞分化为产免疫球蛋白细胞<sup>[2]</sup>。DHS 的发病可能与遗传因素、免疫反应、人类疱疹病毒-6(HHV-6)再激活有关。典型 DHS 的临床表现为用药后(2~6)周内出现发热(高峰可达 40℃),停用致敏药物后仍可持续数周,皮疹早期表现为面、颈、躯干及上肢的红斑、丘疹或荨麻疹样皮疹,可演变为剥脱性皮炎样皮损或红皮病,面部水肿具有特征性<sup>[3]</sup>。在疾病早期,颈部淋巴结肿大可见于超过 70% 的患者,肝脏是最常累及的脏器,其次为肾脏和肺,肾脏受累的严重程度直接影响到 DHS 的死亡风险。实验室检查可见白细胞升高,以淋巴细胞和嗜酸性粒细胞升高为主,超过 70% 的患者有转氨酶升高,随着疾病进展可出现黄疸,急性期可检测到血清 IgG、IgA 和 IgM 水平的下降<sup>[2]</sup>,经过(1~2)周降至最低水平后再逐渐升高,这和 HHV-6 再激活的过程是一致的,因此可以认为免疫球蛋白水平的下降是 DHS 发生的早期信号<sup>[4]</sup>。起病后的(2~3)周,超过 70% 的 DHS 患者可检测到 HHV-6 DNA。关于 DHS 的诊断标准,因 HHV-6 检测在很多地区开展较为局限,2007 年提出了 Regi SCAR 诊断标准<sup>[5]</sup>:①急性发疹;②与药物相关;③需要住院;④发热(体温 > 38℃);⑤至少两个部位淋巴结肿大;⑥至少 1 个脏器受累;⑦至少伴有下列 1 项血液学改变:1)淋巴细胞计数高或低于正常值;2)嗜酸粒细胞计数高于正常值;3)血小板计数低于正常值。前(1~3)项为必要条件,后(4~7)项中满足 3 项。

DHS 的治疗包括:①立即停用可疑致病药物,口服抗组胺类抗过敏药物,局部外用药物进行皮肤护理;②糖皮质激素是 DHS 最主要的治疗药物,对于病情严重者应早期大剂量、短疗程治疗,并适时减量,可以改善患者预后<sup>[6]</sup>。但部分研究表明,糖皮质激素治疗并不能降低 DHS 患者的死亡风险,原因包括可能错过了最佳治疗时机<sup>[7]</sup>、激素使 HHV-6 再激活增强引起病毒感染扩散<sup>[8]</sup>、激素治疗后引起免

疫重建炎症综合征(IRIS)<sup>[5]</sup>;③若伴有肝功能损害或肾功能损害,应使用保肝护肾的药物,必要时予血浆置换治疗,以迅速缓解病情,防止病情恶化而引起多脏器功能衰竭危及生命。对于病情较重的患者,亦可加用丙种球蛋白、抗病毒等治疗。

通过对本例患者的诊治,笔者认识到药物超敏综合征发病隐匿,潜伏期长,早期临床表现多样,症状不典型,每次开处方前应详细询问患者本人及家族过敏史,严把用药指征,切忌滥用品,还应熟知所用药物的药理特性及其化学结构,避免交叉过敏,用药期间如出现皮肤瘙痒、皮疹、发热、淋巴结肿大、肝肾功能异常等,应立即停药观察,患者若治疗不及时,死亡率高,严重威胁患者的生命安全,务必要引起临床医生的重视。

## 参 考 文 献

- 1 陈灏珠,林果为,王吉耀.实用内科学.第 14 版.北京:人民卫生出版社,2013,2 566.
- 2 Kano Y, Inaoka M, Shiohara T. Association between anticonvulsant hypersensitivity syndrome and human herpesvirus 6 reactivation and hypogammaglobulinemia. Arch Dermatol, 2004, 140: 183~188.
- 3 张学军.皮肤性病学.第 8 版.北京:人民卫生出版社,2015, 125.
- 4 Kano Y, Seishima M, Shiohara T. Hypogammaglobulinemia as an early sign of drug-induced hypersensitivity syndrome. J Am Acad Dermatol, 2006, 55: 727~728.
- 5 Shiohara T, Kano Y. Review of drug-induced hypersensitivity: special emphasis on drug-induced hypersensitivity syndrome. Expert Dermatol, 2012, 7: 539~547.
- 6 Michaels B. The role of systemic corticosteroid therapy in erythema multiforme major and Stevens-Johnson syndrome: a review of past and current opinions. J Clin Aesthet Dermatol, 2009, 2(3): 51~55.
- 7 Ramasamy SN, Korb-Wells CS, Kannagara DR, et al. Allopurinol hypersensitivity: a systematic review of all published cases, 1950-2012. Drug Saf, 2013, 36(10): 953~980.
- 8 Fields KS, Petersen MJ, Chiao, et al. Case reports: Treatment of nevirapine-associated dress syndrome with intravenous immune globulin. J Drugs Dermatol, 2005, 4: 510~513.