

# 糖尿病临床

主管单位：中国科学技术协会

主办单位：中华中医药学会

新闻特质 临床视野

敬赠全国内分泌/糖尿病科医生阅读

2014年5月 第8卷 第5期 总第79期

## 新版防治指南对糖尿病患者 血脂管理做了哪些改变

基于肠促胰素的治疗是否准备好  
用于2型糖尿病住院患者？

警惕！高尿酸血症患病率直追糖尿病

治疗糖尿病足骨髓炎主要  
使用手术还是抗生素？

糖尿病患者心脏相关并发症的管理

科技部万方数据库全文收录期刊  
中国学术期刊总库（CNKI）收录期刊  
中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊  
中文科技期刊数据库收录期刊

ISSN 1672-7851



9 771672 785137

# 糖尿病临床

2007年创刊 第8卷 第5期 总第79期 2014年5月31日出版

## 目次

社长  
王奕

副社长  
黄列军

编辑  
《糖尿病天地》杂志编辑委员会  
100085 北京市海淀区上地信息路甲28号  
科实大厦A-12A-2  
电话: (010) 51260912  
传真: (010) 51260912  
网址: www.tnbd365.com  
E-mail: dw51260912@163.com

共同主编  
纪立农 宁光

名誉主编  
Ralph A. DeFronzo

副主编  
郭晓惠 周智广 邢小平 母义明  
邹大进 高鑫 肖海鹏 洪天配

编辑部主任  
黄列军

编辑  
徐赫男

美术编辑  
张立红

学术指导  
中国医师协会内分泌代谢科医师分会

出版  
《糖尿病天地》杂志社  
100085 北京朝阳区和平街北口樱花路甲4号  
电话: (010) 64274797

广告经营许可证  
京朝工商广字第0350号

发行  
国内: 北京报刊发行局  
国外: 中国国际图书贸易总公司

邮购  
《糖尿病天地》杂志社发行部  
100085 北京市海淀区上地信息路甲28号  
科实大厦A-12A-2  
电话: (010) 51260912  
传真: (010) 51260912

定价  
每期5.00元, 全年60.00元

中国标准连续出版物号  
ISSN 1672-7851 CN 11-5210/R

邮发代号  
80-742

如有印装质量问题, 请向《糖尿病天地》杂志社调换。  
如需相关外文参考文献, 请与本刊编辑部联系。

### 热点评述

新版防治指南对糖尿病患者血脂管理做了哪些改变..... 纪立农 197

### 专家共识

老年2型糖尿病管理全球指南..... 国际糖尿病联盟 200

成人糖尿病管理营养治疗建议..... 美国糖尿病协会 209

### 锐海拾贝

胰岛素短期强化后转预混两针的简化方案..... 216

### 三诺讲糖

高尿酸与糖尿病肾病..... 王璟 218

### 基层园地

基于肠促胰素的治疗是否准备好用于2型糖尿病住院患者? ... 切法卢 220

GLP-1受体激动剂的时代已经到来! ..... 施瓦兹 德弗罗佐 220

胰岛素治疗已经证明了自己, 应被作为治疗的基石

..... 阿姆皮埃罗斯 科瑞考斯基 224

警惕! 高尿酸血症患病率直追糖尿病..... 228

### 经验交流

治疗糖尿病足骨髓炎主要使用手术还是抗生素? ... 利普斯基 229

### 临床综述

糖尿病患者心脏相关并发症的管理..... 维恩伯格 等 232

### 消息

推荐好友关注tnbtd365, 收集全套《糖尿病解决之道》..... 233

# CLINICAL JOURNAL OF DIABETES WORLD

Monthly Established in September 2007 Volume 8, Number 5 May 31, 2014

## President

WANG Yi

## Vice-President

HUANG Lie-jun

## Editor Committee

Diabetes World Magazine ,  
A-12A-2, Keshi Plaza , No.A-28,  
Xinxi Road, Haidian District,  
Beijing 100085, China  
Tel: 0086-10-51260912  
Fax: 0086-10-51260912  
Website: www.tnb365.com  
E-mail: dw51260912@163.com

## Editor-in-Chief

Ji Li-nong NING Guang

## Deputy Editor-in-Chief

GAO Xin GUO Xiao-hui  
HONG Tian-pei MU Yi-ming  
XIAO Hai-peng XIN Xiao-ping  
ZHOU Zhi-guang ZOU Da-jin

## Direct of Editorial Department

HUANG Lie-jun

## Editor

XU He-nan

## Art Designer

ZHANG Li-hong

## Overseas Distributor

China International Book Trading  
Corporation P.O.Box 399,  
Beijing 100034, China

## Price

\$ 4.8 for each issue, \$ 57.6 for a year

## CSSN

ISSN1672-7851 CN11-5210/R

## CONTENTS IN BRIEF

### Spotlight Comments

The Change of Recommendation for Blood Lipid Management in the new  
Prevention and Cure Guideline .....197  
Ji Li-nong

### Expert Consensus

International Diabetes Federation Managing Older People  
with Type 2 Diabetes Global Guideline .....200  
IDF  
Nutrition Therapy Recommendations for the Management  
of Adults With Diabetes .....209  
ADA

### Case Study

The Simplified Solution of Premixed Insulin Twice a Day  
after Short-term Intensive Insulin Therapy .....216

### Sannuo Jiangtang

Hyperuricemia and Diabetic Nephropathy .....218

### Primary Care

The time has come for GLP-1 receptor agonists! .....220  
Schwartz DeFronzo  
Insulin therapy has proven itself and is considered the mainstay of Treatment .. 224  
Umpierrez Korytkowski  
Alert! The Prevalence of Hyperuricemia among Chinese Adults has gotten close to  
the Prevalence of Diabetes Mellitus ..... 228

### Experience Exchange

Treating Diabetic Foot Osteomyelitis Primarily With Surgery or Antibiotics: Have  
We Answered the Question? .....229  
Lipsky

### Clinical Review

Managing Heart-Related Complications in Patients With Diabetes .....232  
Weinberg et al

# 安心降糖 立刻选择

- 全面降低3大关键指标 (FPG、PPG 和HbA<sub>1c</sub>)
- 总体不良事件发生率与安慰剂相似，且低血糖发生率低，不增加体重



## 沙格列汀片

### 安立泽® 简明处方信息

【药品名称】通用名称: 沙格列汀片 商品名称: 安立泽/ONGLYZA

【适应症】用于2型糖尿病

- 可作为单药治疗，在饮食和运动基础上改善血糖控制。
- 当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时，可与盐酸二甲双胍联合使用，在饮食和运动基础上改善血糖控制。

【用法用量】口服，推荐剂量5mg每日1次，服药时间不受进餐影响。

【不良反应】常见的不良反应包括有上呼吸道感染，泌尿系感染，头痛，鼻咽炎等（不考虑研究者评估的因果关系）。

【禁忌】对药物中任何一种活性物质或辅料过敏的患者。

【进口药品注册证号】H20110253

(处方前请阅读产品详细说明书) 京药广审(文)第2013030142号

本广告仅供医学药学专业人士阅读

生产商: Bristol-Myers Squibb Company

#### 安立泽 剂量

##### 推荐剂量



5mg 一天一次，不受饮食影响

