

ISSN 2095-9958

CN 10-1316/R

中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)

2017年12月 第10卷第6期 Volume 10 Number 6 Dec 2017

中华骨与关节外科杂志

ZHONGHUA GU YU GUANJIE WAIKE ZAZHI



Chinese Journal of Bone and Joint Surgery

ISSN 2095-9958



万方数据

主管：国家卫生和计划生育委员会

主办：中国医学科学院



中华骨与关节外科杂志

ZHONGHUA GU YU GUANJIE WAIKE ZAZHI

双月刊 2008年4月创刊 第10卷 第6期 2017年12月

主 管

国家卫生和计划生育委员会

主 办

中国医学科学院

主 编 邱贵兴

编辑部主任 高 鹏(代)

编辑出版

中国协和医科大学出版社

《中华骨与关节外科杂志》编辑部

北京东单三条9号(100730)

电话:010-65281306

E-mail: guguangjie@126.com

投稿网址: www.cjbjs.com

印 刷

北京联合互通彩色印刷有限公司

中国标准连续出版物号

ISSN 2095-9958

CN 10-1316/R

广告许可证

京东工商广字第0342号

广 告

《中华骨与关节外科杂志》市场部

发 行

中国协和医科大学出版社期刊中心

地址: 北京东单三条9号

邮 发

全国各地邮电局

邮发代号: 82-735

定 价

每期15.00元, 全年6期90.00元

本期责任编辑 孙 维, 刘亦男

本期英文编辑 李丹阳, 刘亦男

本刊版权归《中华骨与关节外科杂志》编辑部所有

目 次

主编致辞 (451)

健康中国专栏

打造人民群众满意的高素质卫生计生队伍推动卫生与健康事业实现
新跨越 刘延东 (452)

深化卫生与健康事业改革发展 奋力开创健康中国建设新局面
..... 刘延东 (456)

医学的使命与困惑 韩启德 (464)

论医学与人文的对话 许嘉璐 (465)

大力推进医学人文建设 曾益新 (467)

健康中国与骨科慢病防控 邱贵兴 (468)

健康中国与医学人文建设 张雁灵 (470)

对健康现代化的五点建议 任玉岭 (472)

引领全球精准医学发展 推动健康中国2030建设 张华, 詹启敏 (474)

健康医疗大数据的探索与实践 何毅, 王曙光, 刘文浩 (482)

叙事医学及其在临床医学的实践 郭莉萍 (488)

实施老年缓和医疗就是践行人文关怀理念 葛楠 (492)

医院大数据的集成融合与利用 计虹 (494)

高血压诊疗的成本效益分析 徐宁, 田利源, 王新宴 (496)

“健康中国”背景下的安全用药教育研究 赵丹惠, 吕霁航, 韩亮, 等 (499)

健康中国与儿童安全用药情况分析周文清,赵丹惠,吕霁航,等 (502)

“健康中国”战略下药物基因组学的机遇与挑战刘爽,弓孟春 (505)

世界健康现代化的定量评价(2000~2014年)叶青,何传启 (510)

世界健康现代化的历史与经验刘雷 (517)

基于风险—状况—响应的健康现代化100个核心指标李力,何传启 (521)

综述

髌骨骨折治疗进展韩峰,黎缝峰,芮永军 (525)

2017膝关节重建术新进展程开源,翁习生 (530)

速碧林®
那屈肝素钙
Fraxiparine®
nadroparin calcium

那屈肝素钙注射液

速碧林®

安心手术 远离血栓



简短处方信息

【通用名称】那屈肝素钙注射液

【商品名称】速碧林®Fraxiparine®

【适应症】

在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静脉血栓栓塞性疾病。治疗已形成的深静脉血栓。联合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非Q波性心肌梗塞急性期的治疗。在血液透析中预防体外循环中的血凝块形成。

【剂量和使用方法】

在预防和治疗中，那屈肝素应通过皮下注射给药。对于中度血栓栓塞形成危险的手术，而且患者没有显示有严重的血栓栓塞危险，每日注射2850IU (0.3ml) 就可有效起到预防作用。大约在术前2小时进行第一次注射。

高度血栓栓塞形成危险的手术：髋关节和膝关节手术。使用的剂量应该随患者的体重进行调节。每日注射的剂量是：38IU/kg

• 术前，例如手术前12小时
• 术后，例如手术后12小时
• 以后每日使用，一直到手术后第三天
从手术后第四天起剂量调整为57IU/kg。

【禁忌】

那屈肝素禁用于下列情况：
对那屈肝素或那屈肝素注射液中任何赋形剂过敏。
有使用那屈肝素发生血小板减少的病史（详见说明书）。

禁忌症和不良反应详见说明书

与止血异常有关的活动性出血或出血风险的增加，不是由肝素引起的弥散性血管内凝血除外。可能引起出血的器质性损伤（如活动的消化性溃疡）。

出血性脑血管意外。

急性感染性心内膜炎。

接受血栓栓塞疾病、不稳定心绞痛以及非Q波性心肌梗塞治疗的严重肾功能损害（肌酐清除率小于30ml/min）的患者。

【不良反应】

非常常见（≥1/10）

- 不同部位的出血，尤其是那些还合并其他危险因素的患者

- 注射部位的小血肿。

常见（≥1/100 至 <1/10）

- 转氨酶升高，通常为过一性的。

- 注射部位反应。

【生产企业】企业名称：Glaxo Wellcome Production

生产地址：1 rue de l' Abbaye, 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE, FRANCE (法国)

分包装企业名称：葛兰素史克（天津）有限公司

分包装生产地址：天津经济技术开发区第五大街65号

邮政编码：300457 电话号码：022-62012222 传真号码：022-62017150

【批准文号】

分装包装药品批准文号：

0.3ml:3075AXaIU 国药准字J20130167

0.4ml:4100AXaIU 国药准字J20130168

0.6ml:6150AXaIU 国药准字J20130169

进口药品小包装注册证号：

0.3ml: 3075AXaIU H20140346

0.4ml: 4100AXaIU H20140347

0.6ml: 6150AXaIU H20140348

本广告仅供医学药学专业人士阅读



详细处方资料备索

速碧林®Fraxiparine®为葛兰素史克集团公司所拥有之商标

使用前请参阅医师用药指南

为了帮助我们监测GSK药品的安全性，如您发现在使用GSK药品过程中发生任何不良事件或可疑的用药过量，请拨打葛兰素史克服务热线：800-820-3383或400-183-3383

葛兰素史克（中国）投资有限公司
北京市朝阳区东四环中路56号楼远洋国际中心A座9层901-910单元
邮编：100025
电话：+86 10 5925 2888
传真：+86 10 5925 2999

上海分公司
上海市西藏中路168号都市总部大楼6楼
邮编：200001
电话：+86 21 23019800
传真：+86 21 23019801

广州分公司
广州市中山六路218-222号捷泰广场1501室
邮编：510180
电话：+86 20 8132 1880
传真：+86 20 8132 1881