

中国计划生育学杂志

ZHONGGUO JIHUA SHENGYUXUE ZAZHI

ISSN 1004-8189
9 771004 818212



Q K 2 0 6 2 5 3 4 ISSN 1004-8189

CN 11-4550/R

2021

1

第29卷 第1期

2021 Vol.29 No.1

CHINESE
JOURNAL
OF
FAMILY
PLANNING

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

2015年中国百强科技期刊

中国计划生育学杂志

* 中国科技论文统计源期刊
* 中国科技核心期刊
* 中国生物医学文献统计源期刊
* 国家期刊奖百种重点科技期刊
* 2015 年中国百强科技期刊

Chinese Journal of Family Planning

月刊 1992 年 10 月创刊 第 29 卷 第 1 期 2021 年 1 月 15 日出版

目 次

| | |
|---|-------------------|
| 新年寄语 | 吴尚纯 (4) |
| 调查研究 | |
| 978 名在校青少年性行为发生情况及避孕知识调查 | 史满林 董晓静 (5) |
| 不同特征女性人工流产时焦虑、抑郁情绪及影响因素 | 金笑天 陆艳 郭娟等 (8) |
| 临床研究 | |
| 剖宫产术中预防性应用透明质酸防治盆腹腔粘连效果及对血清 MMP9、TGF- β 1 表达的影响 | 张凌云 刘晓 尉云涛 (12) |
| 两种方法治疗剖宫产后 II 型子宫瘢痕妊娠效果比较 | 刘克杰 徐郑军 (17) |
| 腹腔镜联合醋酸亮丙瑞林对子宫内膜异位症合并不育症疗效 | 张靖雪 周夏伶 何伟等 (21) |
| 宫腔镜下切除术联合复方公英散治疗宫腔粘连疗效及患者血清白细胞介素及肿瘤坏死因子变化 | 袁凤玲 贾淑慧 江源 (25) |
| 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂联合腹腔镜手术治疗子宫内膜异位症效果 | 刘阳 郭端英 姜晓琦 (28) |
| 冻融胚胎移植中激素替代周期雌激素应用天数对妊娠结局的影响 | 张欣 王琇 魏学聪等 (33) |
| 宫腔镜电切子宫内膜息肉对患者子宫内膜厚度、血清 VEGF 水平及月经量的影响 | 袁凤玲 贾淑慧 江源 (25) |
| 复发性流产与精子畸形率和 DNA 完整性的相关性分析 | 姜丽丽 罗慧 胡雅平等 (42) |
| 复发性流产患者外周血 FOXP3 mRNA、ROR γ t mRNA 表达及临床诊断价值 | 高艳霞 郑玉霞 (45) |
| 清热复膜汤治疗慢性子宫内膜炎疗效及作用机制探讨 | 孙光娟 甘琴霞 毛洁等 (49) |
| 子痫前期患者血清 AFP、D-二聚体、PLGF 水平对母体及妊娠结局影响 | 景艳辉 向瑛 谢睦星 (55) |
| 妊娠期甲状腺功能减退症孕妇不同时期治疗效果及妊娠结局 | 郑皓宇 肾东 施蒙娜等 (61) |
| 孕前血清丙氨酸氨基转移酶水平与妊娠期糖尿病发病风险相关性 | 贾佳静 邹晓璇 邓雨芝等 (65) |
| 孕妇外周血 NKT 细胞水平与妊娠期肝内胆汁淤积症发病及病情关系 | 徐红娟 卞晓云 陈晓熹等 (71) |
| β -HCG、fFN、AFP 定量联合检测诊断胎膜早破的临床价值 | 周轶 徐秋莲 (75) |
| TAT、PIC、TM、tPAI-C 预测孕中晚期孕妇深静脉血栓价值 | 王宇 孙秋瑾 张雯雯等 (79) |
| 甲地孕酮联合复方苦参注射液对子宫内膜癌患者血清肿瘤标志物及免疫功能的影响 | 刘莹 孙聪 李聪聪 (84) |
| 表柔比星注射液联合甲地孕酮片对子宫内膜癌肿瘤标志物及相关蛋白的影响 | 李银河 赵燕平 刘妮英 (89) |

罗哌卡因-帕瑞昔布纳多模式镇痛在输卵管性不孕患者

- 宫腹腔镜术后镇痛中的应用 李俊 许秋平 彭学等 (93)
多模式超前镇痛对腹式全子宫切除术患者炎性因子、疼痛介质、
应激激素及免疫功能影响 金英杰 (97)
气囊仿生助产术对瘢痕子宫再次妊娠阴道分娩效果及
对免疫应激影响 张玲玲 仇菊季莹 (102)

临床分析

- 高龄产妇中期引产的临床效果 刘朝晖 陈蔚琳 金力 (107)
卵巢低储备患者卵泡液中 AMH、透明质酸水平
及其与获卵结果关系 丁玉玲 安红军 肖葡萄 (110)
孕妇血清 VEGF 和 sFlt-1 联合多普勒超声诊断胎盘植入效果 周冰峰 阎长利 侯敬等 (114)
FER 术联合 UAB 或 UAE 预处理治疗子宫瘢痕妊娠疗效及
影响因素 邹吴春 刘守福 阳袁莉 (118)
高雄激素不同类型多囊卵巢综合征患者糖脂代谢和胰岛功能特征 杨汝静 赵军招 (122)
lncRNA ANRIL 和 VEGF 在原因不明复发性流产绒毛中表达 杨炜婷 温芯 胡洪梅等 (126)
HIV 合并 HBV 感染孕妇 HAART 治疗对妊娠结局和母婴阻断的影响 白雪 苏桂芳 (131)
3 例少见异位妊娠的病例分析并文献回顾 黄隽 梁静 荣春红 (134)
宫腔镜术治疗宫腔黏连后患者 miR-543、miR-135a
表达与再复发关系 陈国英 邱萍 史淑兰 (138)
基因芯片对超声筛查胎儿畸形的诊断效果及其染色体核型异常对比 胡矩锋 宋宇博 王桂喜 (143)
不同孕期孕妇凝血 4 项、D 二聚体水平及 ATⅢ表达变化分析 陈玲 林正明 (146)
妊娠中晚期 TORCH 感染与出生缺陷发生关系分析 孙霞 董春忠 陈玉香等 (149)
p16 与高危型人乳头瘤病毒感染关系及
在不同宫颈病变患者中表达 胡又丹 靳健美 陈丽融等 (152)
子宫内膜息肉患者 PAI-1、TGF-β1 表达与息肉切除术后
发生宫腔粘连关系 高航 师振华 刘湘萍等 (156)
直肠阴道隔子宫内膜异位病灶经阴道部分切除术联合左炔诺孕酮宫内缓释系统
或口服屈螺酮炔雌醇治疗效果 张丽 周娟 王春佟 (160)
984 例高龄孕妇无创产前基因检测结果与妊娠结局分析 赵艳芳 朱健生 万宁等 (164)
阴道镜下宫颈活检联合 EGFR、P16、P53 蛋白检测诊断宫颈病变价值 刘蓓蓓 闫洪超 (168)
子宫内膜异位症不孕并发内膜息肉的病理特征及手术后复发分析 陈咏 于月新 (171)
32 例三阴性乳腺癌患者易感基因胚系突变分析 隆建萍 闫有圣 杨涛等 (175)
子宫内膜癌术后化疗对阴道微生态的影响及
与阴道残端感染关系分析 陈丽珍 徐晓英 忽平等 (181)
蛋白激酶 D1 在宫颈癌中的表达及临床意义 帅旭 何跃东 (185)
经阴道彩超联合血清 HE4、miR-21 诊断早期子宫内膜癌价值 任伟利 温德惠 罗兵等 (189)
前次妊娠期糖尿病临床特征对再次妊娠复发性糖尿病影响 程菜 杨美芳 邵婕 (193)
无精子症患者基因检测分析 邓佩佩 马婧 张展羽等 (198)
海口地区高龄备孕女性生殖健康现状分析 黄玲 陈燕娥 王颜 (203)

综述

- 女性恶性肿瘤患者的生育力保护策略 王秋毅 朱慧莉 黄薇等 (207)

本期：责任编辑 董琳 英文审校 邹燕

CHINESE JOURNAL OF FAMILY PLANNING

Monthly Established in October 1992 Volume 29, Number 1 January 15, 2021

| | |
|--|------|
| Survey of the situation of sexual behavior and contraceptive knowledge of 978 adolescents from school | |
| SHI Manlin, DONG Xiaojing | (5) |
| The situation and influencing factors of anxiety and depression of women with different characteristic before abortion | |
| JIN Xiaotian, LU Yan, GUO Juan, et al | (8) |
| The effect of hyaluronic acid for preventing the adhesion of pelvic cavity after cesarean section and its influence on the expressions of serum MMP9 and TGF-β1 | |
| ZHANG Lingyun, LIU Xiao, YU Yuntao | (12) |
| Comparison of the effect of two methods for treating type II cesarean scar pregnancy after cesarean section | |
| LIU Kejie, XU Zhengjun | (17) |
| Influence of laparoscopy combined with leuprolide acetate for treating infertility women with endometriosis on their pregnancy outcomes | |
| ZHANG Jingxue, ZHOU Xialing, HE Wei, et al | (21) |
| The curative effect of hysteroscopic adhesion resection combined with compound Gonging powder for treating women with intrauterine adhesion, and the changes of serum IL-6, IL-10 and TNF-α | |
| YUAN Finagling, JIA Chuhui, JIANG Yuan | (25) |
| Effect of goserelin acetate sustained-release implant combined with laparoscopic surgery for treating women with endometriosis | |
| LIU Yang, GUO Duanying, JIANG Xiaoqi | (28) |
| The influence of estrogen application days in hormone replacement cycle of women with frozen-thawed embryo transfer on their pregnancy outcomes | |
| ZHANG Xin, WANG Xiu, WEI Xuecong, et al | (33) |
| Effects of hysteroscopic electrotomy for treating women with endometrial polyps on their endometrial thickness, serum VEGF level, and menstrual blood volume | |
| CHEN Limei, YING Xiaoyan, WANG Ping, et al | (38) |
| Analysis of the correlation between recurrent spontaneous abortion and sperm malformation rate and DNA integrity | |
| JIANG Lili, LUO Hui, HU Yaping, et al | (42) |
| Expression of FOXP3 mRNA and RORγt mRNA in peripheral blood of women with recurrent spontaneous abortion and their diagnostic value | |
| GAO Yanxia, ZHENG Yuxia | (45) |
| Analysis of the efficacy and the mechanism of Qingrefumo decoction for treating women with chronic endometritis | |
| SUN Guangjuan, GAN Qingxia, MAO Jie, et al | (49) |
| Influence of serum alpha-fetoprotein, D-dimer, and placental growth factor levels on pregnancy outcomes of women with preeclampsia | |
| JING Yanhui, XIANG Ying, XIE Muxing | (55) |
| Therapeutic effect at different stages of pregnant women with hypothyroidism and their pregnancy outcomes | |
| ZHENG Haoyu, XU Dong, SHI Mengna, et al | (61) |
| Study of the relationship between the serum alanine aminotransferase level of pregnant women before pregnancy and their risk of gestational diabetes mellitus | |
| JIA Jiajing, ZOU Xiaoxuan, DENG Yuzhi, et al | (65) |

广告

琪宁

国药准字H20031099
浙药广审(文)第240929-00608
本广告仅供医学药学专业人士阅读

已纳入国家医保目录

黄体酮软胶囊

- 先兆流产、习惯性流产
- 经前期紧张综合症、无排卵型功血、无排卵型闭经
- 更年期综合症

【用法用量】与雌激素（如结合雌激素、倍美力）联合使用：倍美力片：口服，1.25mg，每日一次，共22天；服用倍美力片第13天起服用本品，口服，200mg（2粒），每日2次，共10天。用于先兆流产和习惯性流产、经前期紧张综合症、无排卵型功血和无排卵型闭经，常规剂量为每日200mg-300mg（2-3粒），1次或2次服用。每次剂量不得超过200mg（2粒），服药时间最好远隔进餐时间。

【不良反应】、【禁忌】：详见说明书

招商热线：18969068267 (姚经理)



规格:100mgx12粒/盒 | 100mgx6粒
浙江爱生药业有限公司

生产地址:杭州经济技术开发区二号大街8号 邮编:310016
电话:0571-86917999-1 传真号码:0571-86910101