

中国药学会系列期刊

中国科技论文统计源期刊

中国科技核心期刊

《CAJ-CD规范》执行优秀期刊

ISSN 1007-4406

CN31-1726/R



ZHONGGUO LINCHUANG YAOXUE ZAZHI

中国临床药理学杂志

CHINESE JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY

2018年第27卷第2期

Vol.27 No.2



2018

ISSN 1007-4406



中国药学会

Chinese Pharmaceutical Association

中国临床药理学杂志

双月刊(1992年6月创刊)

出版日期 2018-03-25

第 27 卷 第 2 期

名誉主编 桑国卫 王永铭

主 编 王红阳

执行主编 程能能

社 长 王继鸣

主管单位 中国科学技术协会

主办单位 中国药学会

(<http://www.cpa.org.cn>)

编辑出版 《中国临床药理学杂志》编辑部

地 址 上海市医学院路138号

邮 编 200032

电 话 (021)54237256

(021)64176498

传 真 (021)54237418

E-mail leyz@fudan.edu.cn

网 址 <http://www.chinesejcp.net>

<http://lezz.cbpt.cnki.net>

印 刷 上海港东印刷厂

国内发行 上海市报刊发行局

国内订阅 全国各地邮局

邮发代号 4-573

国外发行 中国国际图书贸易总公司

(北京399信箱,100044)

国外代号 BM 4726

中国标准连续出版物号 $\frac{\text{CN } 31-1726/\text{R}}{\text{ISSN } 1007-4406}$

广告发布登记号 3100420170003

定 价 每期 12.00 元 全年 72.00 元

目 次

· 论 著 ·

- 抑制性寡核苷酸对狼疮样模型小鼠的治疗作用 孙波峰, 耿颖辉, 陆 叶, 等(77)
- 精制冠心病指纹图谱的建立 李心冬, 边 雨, 苏 婷, 等(83)
- 银杏叶提取物片联合胞磷胆碱钠治疗脑白质疏松认知障碍的临床疗效及其可能机制 杨 毅, 韩晨阳, 张晚玲, 等(87)
- 参附注射剂联合多巴胺治疗感染性休克患者的疗效及相关机制 朱仕兵, 陈志明, 王艳鹏, 等(91)
- 参麦注射剂联合低分子肝素对血液高凝状态的晚期肺癌患者的影响 张刘海, 吕 群(95)

· 医师药师园地 ·

- HPLC法测定乳汁中奥硝唑浓度 叶朝辉, 余 莉, 苗彩云, 等(99)
- 非胰岛素依赖型糖尿病患者用药依从性及其影响因素 冯轶杉, 姚 远, 唐原君, 等(102)
- 右美托咪定复合七氟醚在小儿先天性心脏病介入封堵术中的应用 廖俊锋, 彭文勇(106)
- 头孢曲松与结石形成相关性文献分析 赵晓锦, 胡亚洁, 孙淑娟(109)

· 临床药师评价指南 ·

- 美国 ACCP 临床药师胜任力标准 American College of Clinical Pharmacy(113)
- 美国 ACCP 临床药师胜任力评价模板 American College of Clinical Pharmacy(117)

· 合理用药 ·

- 我院急性脑梗死患者活血化瘀类中药注射剂临床应用的合理性 方彩霞, 李万志, 南文庆, 等(122)
- 处方点评制度对门诊抗菌药物处方比例的影响 柳海环, 柳海琛, 吴晨曦, 等(125)

· 经验交流 ·

- 抗凝分级管理服务模式的构建 田薇薇, 刘 霞, 马明华, 等(130)
- 1例哮喘-慢阻肺重叠综合征伴支气管扩张合并感染患者的药学监护 袁海玲, 张 文, 何冰心, 等(132)
- 对1例慢性嗜酸性粒细胞肺炎体发热患者的药学监护 汪 麒, 汪传主, 王 希, 等(136)

· 药物不良反应 ·

- 小剂量长期服用阿德福韦酯致范可尼综合征及低磷软骨症1例 张晓丹, 王 斌(141)
- 左氧氟沙星致高龄老年患者血小板减少1例 李宏春, 应 茵, 罗科学, 等(142)

Chinese Journal of Clinical Pharmacy

Founded in June, 1992

Date of Publication

Every two months (Bimonthly)

Vol 27, No. 2 / March 25, 2018

Honorary Editor-in-Chief

SANG Guowei WANG Yongming

Editor-in-Chief

WANG Hongyang

Executive Editor-in-Chief

CHENG Nengneng

Director of Publishing House

WANG Jiming

Directed by

China Association for Science and
Technology

Sponsored by

Chinese Pharmaceutical Association
http://www.cpa.org.cn

Edited and Published by

Publishing House of Chinese Journal
of Clinical Pharmacy
138 Yi Xue Yuan Road,
Shanghai 200032, China
Tel: 86-21- 5423 7256
86-21- 6417 6498
Fax: 86-21- 5423 7418
E-mail: leyx@fudan.edu.cn
http://www.chinesejcp.net
http://lczz.cbpt.cnki.net

Printed by

Shanghai Gangdong Printing Factory

Domestic Distribution

Shanghai Post Offices

Domestic Subscription

Local Post Offices

Post Code

4-573

Overseas Subscription

China International Book Trading
Corporation(Po Box 399,
Beijing 100044, China)
Code No. BM 4726

CN 31-1726/R

ISSN 1007- 4406

CONTENTS

• **Original Articles** •

- Beneficial effects of inhibitory oligodeoxynucleotide on systemic lupus erythematosus-like syndrome in BALB/c mice SUN Bofeng, OU Yingye, LU Ye, et al(77)
- Establishment of fingerprints of Jingzhi Guanxin tablets
..... LI Xindong, BIAN Yu, SU Ting, et al(83)
- Effects of Ginkgo biloba extract tablets combined with citicoline sodium in treatment of leukoaraiosis-cognitive impairment and its possible mechanism
..... YANG Yi, HAN Chenyang, ZHANG Xiaoling, et al(87)
- Effect of Shenfu injection combined with dopamine in treatment of septic shock and its related mechanism ZHU Shibing, CHEN Zhiming, WANG Yanpeng, et al(91)
- Influence of Shenmai injection combined with low molecular weight heparin on advanced lung cancer patients with hypercoagulation
..... ZHANG Lihai, LYU Qun(95)

• **Forum for Doctors and Pharmacists** •

- Determination of ornidazole concentration in breast milk by HPLC
..... YE Chaohui, YU Li, MIAO Caiyun, et al(99)
- Medication adherence and influence factors in noninsulin-dependent diabetic patients FENG Yishan, YAO Yuan, TANG Yuanjun, et al(102)
- Clinical observation of sevoflurane combined with dexmedetomidine in children with congenital heart disease surgery closure LIAO Junfeng, PENG Wenyong (106)
- Literature analysis of ceftriaxone and lithiasis formation's correlation
..... ZHAO Xiaojin, HU Yajie, SUN Shujuan(109)

• **Guidelines for Evaluation of Clinical Pharmacists** •

- ACCP clinical pharmacist competencies
..... American College of Clinical Pharmacy(113)
- ACCP template for evaluating a clinical pharmacist
..... American College of Clinical Pharmacy(117)

• **Rational Drug Use** •

- Utilization of traditional Chinese medicine injections for invigorating blood circulation and eliminating stasis in patients with acute cerebral infarction in our hospital
..... FANG Caixia, LI Wanzhi, NAN Wenqing, et al(122)
- Influence of prescription review system on the proportion of antibacterial drugs of prescription in outpatient and emergency departments
..... LIU Haihuan, LIU Haichen, WU Chenfan, et al(125)

• **Experience Communication** •

- Construction of anticoagulation grading management services
..... TIAN Weiwei, LIU Xia, MA Minghua, et al(130)
- Pharmaceutical care practice for a patient with Asthma - COPD overlap syndrome and bronchiectasis complicating infection
..... YUAN Hailing, ZHANG Wen, HE Bingxin, et al(132)
- Pharmaceutical care practice for a patient of chronic eosinophilic pneumonia with fever
..... WANG Qi, WANG Chuanzhu, WANG Xi, et al(136)

• **Adverse Drug Reactions** •

- Fanconi's syndrome and osteomalacia caused by adefovir dipivoxil: one case report
..... ZHANG Xiaodan, WANG Bin(141)
- Thrombocytopenia caused by levofloxacin in one elderly patient
..... LI Hongchun, YING Yin, LUO Kexue, et al(142)

直击 ASCVD¹

动脉粥样硬化性心血管疾病



强大证据
稳妥在握²⁻⁷

立普妥[®]简明处方¹

商品名：立普妥
通用名：阿托伐他汀钙
剂型：白色椭圆形薄膜剂
包装规格：10mg, 20mg, 40mg, 活性成分：阿托伐他汀钙

批准文号：
10mg：国药准字H20051407
20mg：国药准字H20051408
40mg：国药准字H20051409

适应症：
· 高胆固醇血症
原发性高胆固醇血症患者，包括家族性高胆固醇血症(杂合子型)或混合性高脂血症(相当于Fredrickson 分类法的IIa 和IIb 型)患者，如果饮食治疗和其它非药物治疗疗效不满意，应用本品可治疗其总胆固醇升高、低密度脂蛋白胆固醇升高、载脂蛋白B升高和甘油三酯升高。在纯合子家族性高胆固醇血症患者，阿托伐他汀钙可与其它降脂疗法合用或单独使用，以降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。

· 冠心病
冠心病或冠心病等危症(如：糖尿病，症状性动脉粥样硬化性疾病等)合并高胆固醇血症或混合型血脂异常的患者，本品适用于：降低非致死性心肌梗死的风险、降低致死性和非致死性卒中的风险、降低血管重建术的风险、降低因充血性心力衰竭而住院的风险、降低心绞痛的风险。

用法用量
常用的起始剂量为10mg每日一次。剂量范围是每日10-80mg，不受时间和进餐影响。原发性高胆固醇血症和混合性高脂血症：10mg，每日一次；杂合子家族性高胆固醇血症：初始10mg/日，以每4周为间隔逐步调整剂量至40mg/日，如未达到满意疗效，可选择将剂量调整至最大剂量80mg/日或以40mg每日一次配用胆酸螯合剂治疗；纯合子家族性高胆固醇血症：推荐剂量是10-80mg/日。肾功能不全患者用药剂量，肾脏疾病既不会对本品的血浆浓度产生影响，也不会对其降脂效果产生影响，所以无需调整剂量。

禁忌
禁用于活动性肝脏疾病，包括原因不明的肝脏转氨酶持续升高；对本品中任何成分过敏；妊娠及哺乳期妇女。

不良反应
在不考虑因果关系的情况下，最常见的不良反应为鼻咽炎、关节痛、腹泻、四肢痛和泌尿道感染。

药物过量
本品过量尚无特殊治疗措施。一旦出现药物过量，患者应根据需要采取对症治疗及支持性治疗措施。由于立普妥与血浆蛋白广泛结合，血液透析不能明显增加立普妥的清除。

辽药广审第2017030034号，本广告仅供医学、药学专业人士阅读

药物相互作用
与他汀类可能产生相互作用的药物包括：人免疫缺陷病毒(HIV)蛋白酶抑制剂(如洛匹那韦、达芦那韦、利托那韦)、唑类抗真菌药(如伊曲康唑、氟康唑)、大环内酯类抗感染药(如红霉素、克拉霉素、泰利霉素)、贝特类调脂药(如吉非贝特、苯扎贝特)、烟酸、奈法唑酮、环孢素、胺碘酮、地尔硫卓、夫地西酸等。在应用他汀类药物治疗期间，与下列药物合用可增加发生肌病的危险性，如：纤维酸衍生物、调脂剂量的烟酸、环孢素或细胞色素P450 3A4 (CYP 3A4) 强抑制剂(如克拉霉素、人免疫缺陷病毒(HIV)蛋白酶抑制剂及伊曲康唑)。

注意事项
骨髓肌、环孢素A、贝特类药物、红霉素、克拉霉素、秋水仙碱、丙型肝炎蛋白酶抑制剂、HIV蛋白酶抑制剂、烟酸或唑类抗真菌药则增加肌病的危险，应认真监测患者的肌肉的体征和症状，定期进行肌酸磷酸激酶的测定，如该酶水平显著升高或确诊疑诊疾病，应中断治疗。肝功能异常：治疗前，建议进行肝功能检测，并此后根据临床指征重复检测。治疗的过程中，如果发生严重的肝损伤伴有临床症状和高胆红素血症或黄疸，立即停止治疗。在近期有卒中或短暂性脑缺血发作患者中的应用；出血性卒中和缺血性卒中病史的患者应用本品可能增加出血性卒中的风险。糖代谢：他汀类药品的上市后监测中有增加糖化血红蛋白和空腹血糖的报道。

详细资料参见药品说明书。
1.立普妥[®]产品说明书, 2016年09月02日版

