

中华医学会系列杂志

QK1713751

ISSN 0529-567X
CN 11-2141/R

中华妇产科杂志[®]

ZHONGHUA FUCHANKE ZAZHI

2017年6月 第52卷 第6期

CHINESE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Volume 52 Number 6
June 2017



中华医学会

CHINESE
MEDICAL
ASSOCIATION

ISSN 0529-567X



9 770529 567179



中华妇产科杂志®

CHINESE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

月刊 1953年4月创刊 第52卷 第6期 2017年6月25日出版

主管
中国科学技术协会

主办
中华医学会
100710,北京市东四西大街42号

编辑
中华妇产科杂志
编辑委员会
100710,北京市东四西大街42号
电话:(010)85158215
传真:(010)85158358
Email:cjog@ema.org.cn
http://www.medline.org.cn
http://www.zhfkzz.org.cn

总编辑
郎景和

编辑部副主任
沈平虎

出版
《中华医学杂志》社有限责任公司
100710,北京市东四西大街42号
电话(传真):(010)85158180
Email:office@ema.org.cn

广告代理
北京华康广告公司
100710,北京市东四西大街42号
电话(传真):(010)85158184
Email:hua_kang@vip.163.com

广告发布登记号
京东工商广登字20170015号

印刷
北京市十月印刷有限公司

发行
范围:公开
国内:中国邮政集团公司
北京报刊发行局
国外:中国国际图书贸易集团
有限公司
(北京399信箱,100044)
代号 M91

订购
全国各地邮政局
邮发代号 2-63

邮购
中华医学会杂志社市场营销部
100010,北京东四邮局100010-58信箱
电话:(010)85158299,85158339
Email:info@ema.org.cn

定价
每期24.00元,全年288.00元

中国标准连续出版物号
ISSN 0529-567X
CN 11-2141/R

2017年版版权归中华医学会所有

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题,可向中华医学会杂志社市场营销部调换

目次

述评

- 亟待推进盆腔器官脱垂修复手术的标准评价 朱兰 361

盆底手术相关研究

- 经阴道宫骶韧带高位悬吊术的远期疗效研究 段磊 鲁永鲜 沈文洁等 363
- 应用常规手术器械行骶棘韧带固定术治疗Ⅲ~Ⅳ度盆腔器官脱垂的前瞻性研究 任常 宋晓晨 朱兰等 369
- 盆底修复手术后复发81例的再治疗方法及疗效分析 范水秀 王凤玫 林丽莎等 374
- 1996—2015年盆腔器官脱垂中文观察性研究论文撰写质量分析 王一婷 陶立元 贺豪杰等 379

临床研究

- 上海市1996—2015年孕产妇死亡情况分析 秦敏 朱蓉 杜莉等 386
- 滋养细胞的内质网应激在妊娠期肝内胆胆汁淤积症中的作用 俞颖 周承亮 俞田田等 392
- 预防性化疗对40岁以上侵蚀性葡萄胎患者治疗结局及预后的影响 蒋诗阳 李玲 赵峻等 398

基础研究

- 卵巢上皮性癌患者外周血BARD1基因单核苷酸多态性与BRCA1基因突变风险的关系 刘伟玲 赵九洲 王志中等 403

短篇论著

- 可疑生殖腺嵌合体一例的基因检测及产前诊断 何怡 姜季武 赵颖等 411
- 全胚冷冻后首次冻融胚胎移植方式的探讨 韩笑 陈圆辉 张亚楠等 413
- KDM5B基因在卵巢上皮性癌组织中的表达及其对细胞增殖和转移的影响 张立伟 金悦 胡秋博等 417
- 沉默FABP-5基因表达对卵巢上皮性癌细胞生物学特性的影响 王露玉 刘利芬 张莹等 421

病例报告

白塞综合征致子宫颈巨大溃疡一例 陈媛媛 王颖梅 薛凤霞 424

综 述

剖宫产术后瘢痕子宫孕妇的子宫下段厚度与再次妊娠后

子宫破裂风险的研究进展 陈钰 张力 杨帆等 425

CA₁₂₅和人附睾蛋白4对预测卵巢上皮性癌治疗效果及预后的意义 廖胜斌 李力 429

读者·作者·编者

关于重视引用国内文献的意见 378

《中华妇产科杂志》稿约(电子版)的官方网站链接 416

关注中华医学会杂志社妇产科专业微信服务平台“妇产科空间” 432

消 息

中华医学会杂志社指南与进展巡讲(产科)会议通知 397

奥赛托星-缩宫素鼻喷雾剂临床应用有奖征文通知 428

启 事

《中华妇产科杂志》专业领域内公知公认的缩略语直接使用的说明 中文目次2

《中华妇产科杂志》第十二届编辑委员会名单 373

本刊稿约见本卷第1期第71页

本期执行编委 郎景和

本期责任编辑 姚红萍 责任排版 赵 健

·启事·

《中华妇产科杂志》专业领域内公知公认的缩略语直接使用的说明

为了方便、简洁地使用本专业领域内的名词术语及其缩略语,本刊特公布公知公认的部分缩略语,作者在撰写文章时可以直接使用以下缩略语,而不必再注明其全称。未公布的名词术语,请按照如下规则进行缩写:原词过长(一般为超过4个汉字)且在文中多次出现者,若为中文缩略语可于第1次出现时写出全称,在括号内写出缩略语,如:卵巢上皮性癌(卵巢癌);若为外文缩略语可于第1次出现时写出中文全称,在括号内写出外文全称及其缩略语,如:体质指数(body mass index, BMI)。

本说明从2017年第1期开始执行。以下为可直接使用的缩略语,括号内为缩略语的全称。

一、英文缩略语

AFP(甲胎蛋白);AIDS(获得性免疫缺陷综合征);B超(B型超声);CA(癌相关抗原,如:CA₁₂₅);CD(分化群,如:CD₄⁺T淋巴细胞);cDNA(互补DNA);CT(计算机体层摄影);DIC(弥漫性血管内凝血);ELISA(酶联免疫吸附试

验);ER(雌激素受体);FSH(卵泡刺激素);HBcAg(乙型肝炎病毒核心抗原);HBeAg(乙型肝炎病毒e抗原);HBsAg(乙型肝炎病毒表面抗原);hCG(人绒毛膜促性腺激素);HE染色(苏木精-伊红染色);HELLP综合征(溶血、肝酶升高和低血小板计数综合征);HIV(人类免疫缺陷病毒);HPV(人乳头状瘤病毒);ICU(重症监护病房);Ig(免疫球蛋白,如:IgA、IgM);LH(黄体生成素);MRI(磁共振成像);mRNA(信使RNA);PCR(聚合酶链反应);PR(孕激素受体);SP法(链霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶连接法);TORCH(弓形虫病、其他病毒、风疹、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒)。

二、中文缩略语

彩超(彩色多普勒超声);查体(体格检查);电镜(电子显微镜);放疗(放射治疗);肛查(肛门检查);光镜(光学显微镜);化疗(化学药物治疗);活检(活组织检查);免疫组化(免疫组织化学);胸片(胸部X线片);诊刮(诊断性刮宫)。

CHINESE JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Monthly

Established in April 1953

Volume 52, Number 6

June 25, 2017

Responsible Institution

China Association for Science
and Technology

Sponsor

Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China

Editing

Editorial Board of Chinese
Journal of Obstetrics and
Gynecology
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China
Tel:0086-10-85158215
Fax:0086-10-85158358
Email:cjog@cma.org.cn
http://www.medline.org.cn
http://www.zhfkzz.org.cn

Editor-in-Chief

Lang Jinghe(郎景和)

Deputy Managing Director

Shen Pinghu(沈平虎)

Publishing

Chinese Medical Journals
Publishing House Co., Ltd.
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China
Tel(Fax):0086-10-85158180
Email:office@cma.org.cn

Printing

October Printing Beijing Co., Ltd.

Overseas Distributor

China International Book
Trading Corporation
P.O. Box 399, Beijing 100044, China
Code No.M91

Mail-Order

Marketing Department,
Publishing House,
Chinese Medical Association
Mail-box No.100010-58, Dongsi
Post Office, Beijing 100010, China
Tel: 0086-10-85158299, 85158339
Email:info@cma.org.cn

CSSN

ISSN 0529-567X

CN 11-2141/R

Copyright © 2017 by the Chinese Medical Association

No content published by the journals of
Chinese Medical Association may be
reproduced or abridged without
authorization. Please do not use or copy
the layout and design of the journals
without permission.

All articles published represent the opinions
of the authors, and do not reflect the official
policy of the Chinese Medical Association or
the Editorial Board, unless this is clearly
specified.

CONTENTS IN BRIEF

Editorial

- Problem demanding prompt solution for standardized
evaluation in prolapsed surgery** 361
Zhu Lan

Studies of Pelvic Floor Surgery

- Long-term effectiveness of transvaginal high uterosacral
ligament suspension** 363
Duan Lei, Lu Yongxian, Shen Wenjie, et al
- Prospective cohort study on the outcomes of sacrospinous ligament
fixation using conventional instruments in treating
stage III-IV pelvic organ prolapse** 369
Ren Chang, Song Xiaochen, Zhu Lan, et al
- Re-treatments of recurrence after pelvic floor
repair surgery** 374
Fan Shuixiu, Wang Fengmei, Lin Lisha, et al
- Quality analysis of observational studies on pelvic organ
prolapse in China** 379
Wang Yiting, Tao Liyuan, He Haojie, et al

Clinical Research

- Analysis of maternal deaths in Shanghai from 1996 to 2015** 386
Qin Min, Zhu Rong, Du Li, et al
- Effect of endoplasmic reticulum stress in trophocytes on the
pathogenesis of intrahepatic cholestasis of pregnancy** 392
Yu Ying, Zhou Chengliang, Yu Tiantian, et al
- Effects of prophylactic chemotherapy on outcomes and
prognosis of patients older than 40 years with
invasive mole** 398
Jiang Shiyang, Li Ling, Zhao Jun, et al

Basic Research

- Association between single nucleotide polymorphism of
BARD1 gene and BRCA1 gene mutation in
epithelial ovarian cancer** 403
Liu Weiling, Zhao Jiuzhou, Wang Zhizhong, et al

祥和之光



简明处方信息：

【通用名称】雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装

【适应症】用于自然或术后绝经所致的围绝经期综合症

【规格】
芬吗通® 1/10：白色片为雌二醇1mg，灰色片为雌二醇地屈孕酮片，内含雌二醇1mg和地屈孕酮10mg。
芬吗通® 2/10：砖红色片为雌二醇2mg，黄色片为雌二醇地屈孕酮片，内含雌二醇2mg和地屈孕酮10mg。

【用法用量】
每日口服一片，每28天为一个疗程。前14天，口服1片白色片（若是芬吗通® 2/10，则为砖红色片），后14天，每日口服1片灰色片（若是芬吗通® 2/10，则为黄色片）。一个疗程28天结束后，应于第29天继续开始下一个疗程。

【主要不良反应】常见的不良反应有头痛、偏头痛等。

【禁忌】已知或疑有乳腺癌、雌孕激素依赖性肿瘤、原因不明的生殖道出血、活动性或新近动脉血栓栓塞性疾病等。

禁忌和不良反应等详见说明书。

【注意事项】只有当绝经相关症状对生活质量有不利影响时才能开始激素替代治疗（HRT），对所有病例都应进行至少每年1次的风险和受益仔细评估，并且只有在受益超过风险时才能继续使用HRT。

【包装】每盒为28片水泡眼包装，该包装由PVC/PVDC或覆有铝箔的PVC薄膜制成。

【进口药品注册证号】
芬吗通® 1/10：H20110159，芬吗通® 2/10：H20110208

【生产企业的名称与地址】
名称：Abbott Biologicals B.V.
地址：Veerweg 12, 8121 AA OLST, The Netherlands, 荷兰

本品为处方药，请索取详细处方资料。
本广告仅供医学药学专业人士阅读

沪药广审（文）第 2016050177 号



Abbott
雅培